

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
АФЛАЗИН®

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 капсула містить 200 мг гібіскусу екстракту сухого (*hibisci extractum siccum*).

допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, лактози моногідрат, кремнію діоксид, тверда желатинова капсула (желатин, титану діоксид (E 171), тартразин (E 102), амарант (E 123), еритрозин (E 127), патентований синій V (E 131)).

Лікарська форма. Капсули.

Тверді желатинові капсули бордового кольору, що містять порошок пурпурово-фіолетового кольору з білими краплями.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «АГРОФАРМ».

Україна, 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Центральна, 113 А.

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРО-ФАРМА».

Україна, 03115, м. Київ, вул. Котельникова, 1, оф. 97.

Фармакотерапевтична група.

Інші засоби, що застосовуються в урології. Код АТС G04B X.

Патентований екстракт гібіскусу UTIRose (Burgundy botanical extracts, Франція), який обумовлює фармакологічні властивості препарату, є джерелом органічних кислот (лимонна, оксидурштинна, пірокатехінова, гібіскова), вітамінів, полісахаридів, біофлавоноїдів, які обумовлюють бактеріостатичний ефект препарату Афлазин® проти більшості збудників інфекцій сечовивідних шляхів (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Enterococcus faecalis*, *Escherichia coli*, *Enterobacter spp.*, *Candida spp.*, та інших).

Має протизапальні, протинабрякові властивості, проявляє антиадгезивний ефект, що унеможлиблює адгезію (прилипання) мікроорганізмів до стінок сечовивідних шляхів, їх розвиток та розмноження. Запобігає розвитку дизуричних явищ.

Показання для застосування.

У складі комплексної терапії при гострих та хронічних інфекціях сечового міхура (цистит) і нирок (пієлонефрит), при асимптоматичній бактеріурії, у тому числі й у вагітних жінок.

Хронічні неінфекційні захворювання нирок (гломерулонефрит, інтерстиціальний нефрит), профілактика інфекцій сечовивідних шляхів, у тому числі після інструментальних втручань (ендоскопічні, рентгенологічні та гінекологічні дослідження).

Профілактика утворення сечових каменів, у тому числі після їх видалення.

Протипоказання.

Індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Відсутні.

Особливі застереження.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Застосування в період вагітності або годування груддю. Застосування препарату у перший триместр вагітності можливе тільки за призначенням лікаря. Застосування препарату під час вагітності, починаючи з другого триместру, а також при годуванні груддю не потребує додаткової консультації лікаря.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат можна застосовувати дітям віком від 6 років.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим і дітям віком від 12 років застосовувати по 1 капсулі 2 рази на добу незалежно від прийому їжі. Дітям віком від 6 до 12 років – по 1 капсулі 1 раз на добу. Тривалість застосування встановлюється лікарем індивідуально залежно від тяжкості захворювання. Рекомендована тривалість застосування при гострих запаленнях сечовивідних шляхів та загостренні хронічних захворювань становить 4-6 тижнів. Із профілактичною метою рекомендований курс застосування становить 2-4 тижні.

Передозування.

Випадки отруєння препаратом внаслідок його передозування не відомі.

Побічна дія.

Можливі алергічні реакції на складові компоненти препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Клінічно значуща взаємодія препарату з іншими лікарськими засобами не встановлена. Афлазин® може застосовуватися у поєднанні з антибіотиками та іншими антимікробними засобами.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці за температури не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 капсул у блістері, 3 блістера в упаковці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.