

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ХВОЦА ПОЛЬОВОГО ТРАВА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: herba equiseti arvensis;

1 пачка містить хвоща польового траву 50 г.

Лікарська форма. Трава.

Шматочки стебел і гілок із вузлами, що проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір сірувато-зелений. Запах слабкий. Смак злегка кислуватий.

Назва і місцезнаходження виробника.

Комунальне підприємство Київської обласної ради «Фармацевтична фабрика».

Україна, 01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16.

Фармакотерапевтична група.

Рослинні препарати з діуретичним ефектом. Код АТС С03В Х10.

Трава хвоща польового містить флавоноїди (кверцетин, ізокверцетин, кемпферол, лютеолін, еквізетрин), сапонін еквізетонін, каротин, кислоту аскорбінову, кремнієву, аконітову, яблучну, щавелеву, гіркоти, речовини дубильні і смолисті, солі мінеральні. Цей комплекс біологічно активних речовин виявляє сечогінну, кровоспинну, протизапальну, антимікробну і гіпотензивну дію. Експериментально встановлено, що настої із трави хвоща польового мають дезінтоксикаційну дію, зокрема сприяють виведенню свинцю з організму.

Показання для застосування.

Серцеві та інші захворювання, що супроводжуються набряками; захворювання сечовивідних шляхів (пієліти, цистити, уретрити); легеневі, носові, маткові і гемороїдальні кровотечі; гострі та хронічні отруєння свинцем (у складі комплексної терапії).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до хвоща польового. Нефрити, нефрози, нефрозо-нефрити. Період вагітності і годування груддю.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Безпека та ефективність застосування Хвоща польового трави для дітей не встановлені, тому не рекомендується призначати препарат дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

10 г (2 чайні ложки) трави вміщують в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) гарячої

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

кип'яченої води, закривають кришкою і настоюють на киплячій водяній бані 15 хв. Охолоджують при кімнатній температурі 45 хв, проціджують, залишок віджимають до процідженого настою. Об'єм настою доводять кип'яченою водою до 200 мл. Дорослі приймають у теплому вигляді по ¼ склянки 3 - 4 рази на день через 1 годину після їди. Діти старше 12 років - по 1 чайній ложці 3 рази на день через 1 годину після їди.

Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Передозування.

Препарат, як правило, переноситься добре, проте у деяких хворих при індивідуальній підвищеній чутливості можливий розвиток алергічних реакцій (почервоніння та висипи на шкірі, свербіж).

Побічні ефекти.

Може спричиняти подразнення нирок, що проявляється болем у попереку та в кінці сечовипускання, алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не встановлена.

Термін придатності.

4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в сухому місці при температурі не вище 25 °С.

Приготовлений відвар зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.

Зберігати в недоступному для дітей місці!

Упаковка.

По 50 г у пачці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.