

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
НІТТИФОР

Склад лікарського засобу.

Діюча речовина: permethrin;

1 г крему містить 10 мг перметрину;

допоміжні речовини: метилпарабен, пропілпарабен, четвертинні амонієві сполуки жиру гідрогенізованого, четвертинні амонієві похідні гідролізату протеїну, спирт цетостеариловий, речовина ароматична, барвник, спирт ізопропіловий, вода очищена.

Лікарська форма. Крем.

Крем жовтогарячого кольору зі специфічним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

АТ Фармацевтичний завод ТЕВА (TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company)

4042 Дебрецен, вул. Паллагі 13, Угорщина (H-4042 Debrecen, 13 Pallagi str., Hungary)

Фармакотерапевтична група. Засоби, що діють проти ектопаразитів, включаючи коростяних кліщів. Код АТС R03A C04.

Фармакологічні властивості.

Активна речовина: перметрин - це синтетичний інсектицид, ефективний проти багатьох паразитів, у тому числі вошей, кліщів, бліх та інших артроподів. Перметрин діє на мембрану нервових клітин, припиняє надходження іонів натрієвими каналами, які регулюють поляризацію мембран. Внаслідок цього відбувається затримка реполяризації мембран і параліч паразитів. Згідно з дослідженнями *in vitro* перметрин ефективний відносно вошей і гнид *Pediculus humanus var. Capitis* (головні воші). Висока ефективність лікування пояснюється поєднанням подвійної дії препарату на саму вошу і на її потомство, а також тривалим збереженням препарату на волоссі, що запобігає повторному зараженню.

Показання для застосування. Лікування педикульозу, спричиненого *Pediculus humanus var. Capitis* (головні воші).

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, гострі запальні захворювання шкіри волосистої частини голови, період годування груддю, дитячий вік до 2 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При підвищеній чутливості до компонентів препарату застосування крему необхідно припинити. Хоча перметрин не подразнює слизові оболонки очей, під час обробки препаратом необхідно запобігати потраплянню препарату в очі, а також ніс та ротову порожнину. У разі потрапляння на слизові оболонки їх потрібно промити проточною водою.

Застосовувати препарат на ушкодженій шкірі необхідно тільки під контролем лікаря. Випадкове застосування препарату внутрішньо малими дітьми може спричинити алкогольне отруєння внаслідок вмісту ізопропілового спирту.

Персонал, який проводить багаторазові обробки препаратом, повинен захищати руки гумовими рукавичками.

Волосся необхідно мити теплою водою з шампунем для нормального волосся і вичісувати частим гребенем. Цю процедуру необхідно повторювати двічі на тиждень. Для запобігання зараженню одного від одного необхідно одночасно провести обробку всіх заражених. Непотрібно проводити обробку у тих, у кого не знайдено вошей. Гребінці й щітки для волосся мають бути індивідуальними і їх

необхідно добре вичистити після вичісування. Для знищення вошей і гнид на рушниках, постільній білизні і подушках їх необхідно випрати при температурі не менше 60°C .

Для профілактики не застосовувати!

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Контрольовані клінічні дослідження у вагітних жінок не проводились, тому питання про доцільність застосування препарату у цієї категорії хворих вирішує лікар, оцінюючи співвідношення користь/ризик. *Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або робот з іншими механізмами.* Не виявлена.

Діти. Перметрин нешкідливий і ефективний у дітей після 2 років. Клінічні дослідження щодо безпеки та ефективності у дітей до 2 років не проводились.

Спосіб застосування та дози. Препарат призначений тільки для зовнішнього застосування. Застосування крему «Ніттифор» необхідно проводити на щойно вимитому звичайним шампунем і просушеному насухо волоссі. Перед застосуванням крему флакон необхідно добре струснути. Крем наноситься рівномірно на волосся і шкіру голови (особливо за вухами і на потилиці). Через 10 хвилин необхідно сполоснути волосся водою і висушити. Наприкінці обробки рекомендовано вичесати волосся частим гребінцем для видалення загиблих вошей та гнид. Якщо було виявлено воші на другому тижні після обробки (після 7 днів з моменту застосування препарату), процедуру необхідно повторити.

Передозування. Не виявлено.

Побічні ефекти. Побічна дія зустрічається дуже рідко, слабковиражена, тимчасова. В окремих випадках на місці обробки можуть виникнути алергічні реакції: шкірні висипання, подразнення, легке печіння, свербіж, набряк.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не відома.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі 15-25°C.

Упаковка. 115 г крему з кондиціонером у поліетиленовому флаконі з кришкою; по 1 флакону у картонній пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.