

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ВІНПОЦЕТИН
(VINPROSETINUM)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: vinprosetin ; етиловий ефір аповінкамінової кислоти;

основні фізико-хімічні властивості: таблетки білого або білого зі злегка сіруватим відтінком кольору;

склад: вінпоцетину – 0,005 г;

допоміжні речовини: тальк, крохмаль кукурудзяний, лактоза, магнію стеарат.

Форма випуску. Таблетки.

Фармакотерапевтична група. Психостимулюючі та ноотропні засоби. Код АТС: N06B X18.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Вінпоцетин розширює мозкові судини, посилює кровотік, покращує постачання мозку киснем, сприяє утилізації глюкози. Препарат зменшує агрегацію тромбоцитів і в'язкість крові. Впливає на метаболізм норадреналіну та серотоніну, інгібуючи фосфодіестеразу, підвищує рівень цАМФ у тканинах.

Фармакокінетика. При прийомі внутрішньо біодоступність препарату досягає 70 %. Максимальна концентрація в плазмі відзначається через 1 годину після прийому. Період напіввиведення становить 4,8 години.

Показання для застосування. Вінпоцетин застосовується в неврологічній практиці при порушеннях, пов'язаних з розладами мозкового кровообігу (після перенесеного інсульту атеросклеротичного і посттравматичного походження), при порушеннях пам'яті, запамороченні, афазії, вазовегетативних симптомах, у клімактеричному періоді. В офтальмологічній практиці препарат призначають при закупорці артерій сітківки і вторинних глаукомах, в отоларингологічній – при васкулярному зниженні слуху, при запамороченнях вестибулярного походження.

Спосіб застосування та дози. Вінпоцетин призначають внутрішньо дорослим по 0,005-0,01 г (1-2 таблетки) 3 рази на день. Поліпшення настає зазвичай через 1-2 тижні. Тривалість курсу лікування становить 2 місяці.

Побічна дія. Незначне зниження артеріального тиску. Можливий розвиток тахікардії, рідше - екстрасистолії.

Протипоказання. Важкий перебіг ішемічної хвороби серця, серцеві аритмії, вагітність і період лактації.

Передозування. Про випадки передозування препарату Вінпоцетину не повідомлялось.

Особливості застосування. Обережно призначають пацієнтам з тяжкими формами аритмій, зі стенокардією.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Даних про які-небудь клінічно значимі лікарські взаємодії Вінпоцетин немає.

Умови та термін зберігання. Зберігають в недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці. Термін придатності – 4 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 40 таблеток у пеналах, № 30 (10x3) у контурних чарункових упаковках.

Виробник. Філія ТОВ “Дослідний завод „ГНЦЛС”.

Адреса. Україна, м. Харків, вул. Воробйова, 8.