

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
ГЕРИМАКС ЖЕНЬШЕНЬ
(GERIMAX GINSENG)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: червоно-коричневі круглі таблетки, вкриті оболонкою;

склад:

1 таблетка містить: екстракту кореня женьшеню 200 мг, що відповідає 8 мг гінзенозидів (екстракт отриманий із 100% Panax Ginseng C.A.Meyer);

допоміжні речовини: кальцію гідрогенфосфат, крохмаль кукурудзяний, целюлоза мікрокристалічна, желатин, гідроксипропілметилцелюлоза, магнію стеарат, заліза оксид, макрогол 400.

Форма випуску. Таблетки, вкриті оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Тонізуючі засоби.

Код АТС А 13А.

Фармакологічні властивості. Комплекс біологічно активних речовин женьшеню створює стимулювальну дію на ЦНС, підвищує розумову та фізичну активність.

Показання для застосування. Препарат рекомендується як лікувально-профілактичний засіб:

- для підвищення розумової та фізичної активності, при підвищеному навантаженні, при фізичній перевтомі;
- для підвищення фізичної витривалості у спортсменів;
- в комплексній терапії при неврастенічному синдромі, а також при послабленні статевої функції; при вегето-судинній дистонії за гіпотонічним типом;
- при астеничних станах у період видужання для прискорення процесів відновлення після тяжких захворювань і хірургічних операцій, для підвищення опірності організму.

Спосіб застосування та дози. Дорослим і дітям старше 12 років: препарат приймати по 1 таблетці на добу (у першій половині дня), незалежно від прийому їжі. Курс лікування становить 6-8 тижнів. Повторення курсу можливе через 3 тижні.

Побічна дія. Іноді можливі розлади з боку шлунково-кишкового тракту (діарея, нудота, блювання) або шкірні алергічні реакції у разі підвищеної чутливості до окремих компонентів препарату. Дуже рідко спостерігається тахікардія, головний біль, безсоння, підвищення артеріального тиску, підвищена нервова збудливість.

Протипоказання. Підвищена чутливість до окремих компонентів препарату. Артеріальна гіпертензія. Підвищена збудливість. Епілепсія. Діти до 12 років. Гострі інфекційні захворювання.

Передозування. У разі передозування Геримакс Женьшень пригнічує функції організму. При цьому спостерігається безсоння, головний біль, прискорене серцебиття, біль у ділянці серця, депресія, зниження статевої активності. При отруєнні можливі порушення дихання, втрата свідомості, характерна підвищена кровоточивість, у тому числі криваві блювання та пронос. Терапія - симптоматична. У таких випадках необхідно припинити прийом препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Геримакс Женьшень посилює дію стимуляторів та аналептиків (кофеїн, камфора та ін.) і є антагоністом засобів, які пригнічують функції ЦНС (барбітурати, транквілізатори, протисудомні засоби та ін.).

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі не вище за 25 °С, у місці, недоступному для дітей. Термін придатності - 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Блістери по 10, 30, 60 таблеток, у картонній коробці.

Виробник. Данск Дроге А/С, Данія для Нікомед Австрія ГмбХ.

Адреса. Industrigrenen 10, DK 2635 Ishøj, Denmark ,Dansk Droge A/S.