

## ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

### АЦИКЛОВІР-ФАРМАК (ACICLOVIR-FARMAK)

**Склад:**

діюча речовина: aciclovir;

1 г крему містить ацикловіру мікронізованого в перерахуванні на 100 % суху речовину 50 мг;

допоміжні речовини: парафін білий, м'який; парафін рідкий; спирт цетостеариловий (тип А) емульгований; пропіленгліколь; полоксамер; диметикон; вода очищена.

**Лікарська форма.** Крем для зовнішнього застосування.

**Фармакотерапевтична група.** Хіміотерапевтичні засоби для місцевого застосування. Противірусні засоби. Код АТС D06B B03.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.** Інфекції губ та обличчя, спричинені вірусом простого герпесу.

**Протипоказання.** Гіперчутливість до ацикловіру та інших компонентів препарату, а також до валацикловіру.

**Спосіб застосування та дози.** Препарат призначений лише для зовнішнього застосування.

Дорослим і дітям старше 12 років крем необхідно наносити на уражену ділянку 5 разів на добу кожні 4 години, виключаючи нічний час. Важливо розпочати лікування при перших ознаках інфекції – у продромальний період.

Курс лікування - 5 днів. Якщо покращання не сталося, можна продовжити лікування до 10 днів. Якщо симптоми захворювання не зникають після 10 днів лікування, хворому необхідно звернутися до лікаря. До і після нанесення крему необхідно вимити руки; важливо не розтирати уражені ділянки і не торкатися до них рушником, щоб запобігти погіршенню перебігу захворювання або передачі інфекції.

**Побічні реакції.** Препарат зазвичай добре переноситься, але у ділянці нанесення крему може відчуватися печіння, яке швидко минає, гострий біль, виникнути незначне лущення (при тривалому застосуванні препарату). У поодиноких випадках можливі алергічні прояви у вигляді еритеми і свербіжу, дуже рідко можливий ангіоневротичний набряк; у цих випадках препарат відміняють і при необхідності вживають відповідні заходи (десенсибілізуюча терапія тощо). Дуже рідко повідомлялося про виникнення контактної дерматиту після застосування крему. При проведенні тестів на чутливість подібні випадки пов'язані з компонентами кремової основи, а не з ацикловіром.

**Передозування.** Випадків передозування не спостерігалось. Оскільки препарат призначений тільки для місцевого застосування, розвиток симптомів передозування малоімовірний.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Відсутні дані щодо несприятливої дії ацикловіру під час вагітності або годування груддю, оскільки при місцевому застосуванні ацикловір практично не потрапляє в системний кровообіг і грудне молоко. Однак застосовувати препарат потрібно лише тоді, коли, на думку лікаря, потенційна користь для матері перевищує можливий ризик для плода/дитини.

**Діти.** Даних щодо безпеки застосування препарату дітям віком до 12 років недостатньо, тому рекомендується застосовувати препарат дітям віком старше 12 років.

Інструкцію завантажено з сайту [www.dovgolit.com](http://www.dovgolit.com)

**Особливості застосування.**

Не рекомендується застосування крему на слизових оболонках через можливість подразнення.

Пацієнтам, які страждають на особливо тяжкі прояви герпетичної інфекції, необхідна консультація лікаря; при необхідності одночасно з кремом застосовують препарати ацикловіру системної дії (таблетки, інфузії).

Особам з герпесом на губах (особливо при наявності відкритих уражень), необхідно суворо дотримуватись правил обережності, щоб не допустити інфікування інших людей.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Клінічні дослідження щодо вивчення впливу препарату на швидкість реакції не проводились.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Не слід призначати препарат разом з місцевими катіонними антисептиками.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.** Вибірково діє на віруси Herpes simplex типу 1 і 2, а також Varicella zoster. Конкурентно взаємодіє з вірусною тимідинкіназою і послідовно фосфорилується з утворенням моно-, ди- і трифосфату; останній інгібує ДНК-полімеразу, включається замість дезоксигуанозину до ДНК вірусів і пригнічує реплікацію.

Запобігає утворенню нових елементів висипань, знижує ймовірність шкірної дисемінації і вісцеральних ускладнень, прискорює утворення кірок.

**Фармакокінетика.** При місцевому застосуванні у вигляді крему ацикловір практично не всмоктується в системний кровообіг.

**Фармацевтичні характеристики.**

**Основні фізико-хімічні властивості:** крем білого або майже білого кольору.

**Термін придатності.** 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі від 15 °С до 25 °С; не допускати заморожування препарату.

**Упаковка.** По 5 г у тубі, вкладеній у пачку.

**Категорія відпуску.** За рецептом.

**Виробник.** ВАТ “Фармак”.

**Місцезнаходження.** Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63.