

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
БРОНХІАЛ ПЛЮС ДЛЯ ДІТЕЙ
(З ВІТАМІНОМ С)

Склад лікарського засобу:

| | |
|--|----------|
| <i>діючі речовини:</i> 5 мл сиропу містять: | |
| рідкий екстракт ісландського моху (1:10) | 0,130г; |
| рідкий екстракт мати-й-мачухи (1:10) | 0,130 г; |
| рідкий екстракт квіток липи серцеподібної (1:10) | 0,130 г; |
| рідкий екстракт подорожника ланцетолістного (1:10) | 0,065 г; |
| рідкий екстракт листків і кореня алтею лікарського (1:10) | 0,065 г; |
| рідкий екстракт квіток ромашки (1:10) | 0,065 г; |
| рідкий екстракт ехінацеї вузьколісної (1:10) | 0,065 г; |
| кислота аскорбінова | 0,019 г; |
| <i>допоміжні речовини:</i> сахароза, мед, калію сорбат, натрію бензоат (Е 211), етанол 96 %, вода очищена. | |

Лікарська форма. Сироп.

Сиропоподібна, прозора або опалесцювальна рідина з невеликим дрібнодисперсним осадом від світло- до темно-коричневого кольору, з характерним запахом і смаком. Рослинні екстракти можуть бути причиною помутніння, яке не впливає на якість і термін придатності препарату.

Назва і місцезнаходження виробника.

Др. Мюллер Фарма.

Поухов 182, 503 41 Градец Кралове, Чеська Республіка.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Код АТС R05X.

Натуральний засіб при кашлі і запаленнях верхніх дихальних шляхів, лікуванні застудних захворювань та грипі. Заспокоює подразнювальний кашель, полегшує відхаркування.

Лішайникові кислоти ісландського моху чинять пом'якшувальну, відхаркувальну, бактеріостатичну дію. Імуностимулююча дія екстрактів сприяє швидшому одужанню при захворюваннях дихальних шляхів.

Квітки мати-й-мачухи чинять відхаркувальну, пом'якшувальну, протизапальну дію.

Квітки липи чинять потогінну дію.

Листки подорожника ланцетного чинять бактеріостатичну і бактерицидну дію.

Листки і корінь алтею завдяки високому вмісту слизу чинять протикашльову (обволакуючу,

пом'якшувальну) дію. Екстракт і полісахаридна фракція чинять статистично достовірну протикашльову дію.

Квітки ромашки аптечної чинять протизапальну, бактерицидну і фунгіцидну дію.

Трава ехінацеї підвищує неспецифічні захисні сили організму, активізує фагоцитоз

і стимулює фібробласти. Імуностимулюючу дію чинять компоненти полісахаридної фракції.

Сироп заспокоює сухий кашель, сприяє виділенню слизу, полегшує відхаркування, зменшує запалення слизових оболонок, чинить потогінну, жарознижувальну, протизапальну і протибактеріальну дію.

Показання для застосування. Запалення верхніх дихальних шляхів, які супроводжують-ся кашлем, гострими і хронічними бронхітами, фарингітами, ларингітами, трахеїтами, гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та грип.

Протипоказання. Алергічні реакції на лікарські рослини, що входять до складу препарату.

Особливі застереження.

В 1 мл препарату міститься 2,1 % спирту.

Хворим із рідкісною спадковою непереносимістю фруктози, глюкозо-галактози, мальабсорбції або цукрово-ізомальтозною недостатністю та хворим на цукровий діабет слід враховувати, що в 1 дозі сиропу міститься 2,27 г сахарози.

Діти.

Препарат можна застосовувати дітям віком від 1 року.

Спосіб застосування та дози. Дітям віком від 1 до 3 років – ½ чайної ложки (2,5 мл), дітям віком від 3 років – по 1 чайній ложці (5 мл) 3 - 5 разів на день, розбавляючи теплого чаю або води.

Термін лікування становить 7-10 днів. *Перед вживанням збовтати.*

Передозування.

Не відомо.

Побічні ефекти. В осіб з підвищеною чутливістю до лікарських рослин, що входять до складу препарату, можливі алергічні реакції у вигляді кропив'янки або дерматиту.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не відома.

Термін придатності. 3 роки.

Після відкриття флакона термін придатності препарату – 10 днів.

Умови зберігання. Зберігати в сухому, темному і недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. 130 г у флаконі і картонній коробці.
320 г у флаконі і картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.