

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

УРОФЛОКС
(UROFLOX)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 фільтр-пакет чаю містить бузини чорної квіток 0,3 г, звіробою трави 0,3 г, липи квіток 0,3 г, толокнянки листя 0,3 г, хвоща польового трави 0,3 г.

Лікарська форма. Чай.

Суміш часток різної форми сірувато-зеленого кольору, з буровато-червоними, жовтогарячими, жовтими і білими включеннями; запах слабкий, духмяний.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в урології.

Код АТС G04B X50**.

Фіточай виявляє сечогінну дію і підвищує азотовивідну функцію нирок. Впливає на депураційну функцію нирок. Має спазмолітичну, протизапальну, антибактеріальну та помірну салуретичну дію.

Показання для застосування. Як профілактика та у складі комплексного лікування запальних захворювань нирок і сечовивідних шляхів, що супроводжуються зниженням сечовивідної і азотовивідної функції, сечокам'яної хвороби, при набряках, пов'язаних із захворюваннями серця і бронхолегеневої системи.

Протипоказання. Нефрити, нефрози, нефрозо-нефрити. Підвищена чутливість (алергія) до компонентів препарату. Вагітність та період годування груддю. Діти до 15 років.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Не застосовувати препарат у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Слід бути обережним при керуванні транспортними засобами та виконанні іншої роботи, яка потребує підвищеної уваги, швидких психічних і рухових реакцій.

Діти. Препарат призначають дітям віком від 15 років.

Спосіб застосування та дози. Дорослим та дітям старше 15 років 1 фільтр-пакет заварити 1 склянкою (200 мл) окропу, настоювати протягом 10 хв. Пити теплим по 3-4 склянки на добу для лікування. Для профілактики застосовувати 1-2 рази на добу. Термін лікування слід продовжувати до настання терапевтичного ефекту, але не більше 1 місяця. При необхідності курс лікування можна повторити через 1-2 місяці.

Передозування. При дотриманні рекомендованих доз передозування не спостерігається.

Побічні ефекти. При індивідуальній підвищеній чутливості до препарату можливий розвиток алергічних реакцій (гіперемія, висипи, свербіж та набрякання шкіри), подразнення нирок. При появі побічних реакцій припинити застосування препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не встановлена.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла місці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 1,5 г у фільтр-пакеті, по 25 фільтр-пакетів у картонній пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.