

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
БРОНХІАЛ ПЛЮС ДЛЯ ДІТЕЙ
(з ісландським мохом, ромашкою і вітаміном С)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 5 мл сиропу містять:

рідкий екстракт ісландського моху (1:10)	0,390 г;
рідкий екстракт квіток ромашки лікарської (1:10)	0,260 г;
кислота аскорбінова	0,019 г;

допоміжні речовини: сахароза, мед, калію сорбат, натрію бензоат (Е 211), вода очищена, етанол 96 %.

Лікарська форма. Сироп.

Сиропоподібна, прозора або опалесцювальна рідина з невеликим дрібнодисперсним осадом від світло- до темно-коричневого кольору, з характерним запахом і смаком. Рослинні екстракти можуть бути причиною помутніння, яке не впливає на якість і термін придатності препарату.

Назва і місцезнаходження виробника.

Др. Мюллер Фарма.

Поухов 182, 503 41 Градец Кралове, Чеська Республіка.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Код АТС R05X.

Натуральний засіб, що застосовується при кашлі і запаленнях верхніх дихальних шляхів, лікуванні застудних захворювань і грипу. Заспокоює подразнювальний кашель, полегшує відхаркування. Спеціально підібрана комбінація екстрактів ісландського моху та ромашки з додаванням вітаміну С заспокоює болісний кашель.

Ісландський мох містить велику кількість слизу, який утворює захисну плівку на слизових оболонках запалених верхніх дихальних шляхів.

Лишайникові кислоти ісландського моху чинять пом'якшувальну, відхаркувальну, протимікробну дію. Імуностимулююча дія екстрактів сприяє швидшому одужанню при захворюваннях дихальних шляхів.

Квітки ромашки аптечної чинять протизапальну, бактерицидну і фунгіцидну дію.

Показання для застосування. Запалення верхніх дихальних шляхів, які супроводжуються кашлем; гострі і хронічні бронхіти, застудні захворювання та грип.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Особливі застереження.

В 1 мл препарату міститься 2,1 % спирту.

Хворим із рідкісною спадковою непереносимістю фруктози, глюкозо-галактози, мальабсорбції або цукрово-ізомальтозною недостатністю та хворим на цукровий діабет слід враховувати, що в 1 дозі сиропу міститься 2,27 г сахарози.

Діти.

Препарат можна застосовувати дітям віком від 1 року.

Спосіб застосування та дози. Дітям віком від 1 до 3 років – ½ чайної ложки (2,5 мл), дітям віком від 3 років – по 1 чайній ложці (5 мл) 3-5 разів на день, розбавляючи у теплом чаї або воді.

Термін лікування становить 7-10 днів. *Перед вживанням збовтати!*

Передозування. Не відомо.

Побічні ефекти. В осіб з підвищеною чутливістю до лікарських рослин, що входять до складу препарату, можливі алергічні реакції у вигляді кропив'янки або дерматиту.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не виявлена.

Термін придатності. 3 роки.

Термін придатності препарату після відкриття флакона становить 10 днів.

Умови зберігання. Зберігати в сухому, темному і недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. 130 г у флаконі і картонній коробці.

320 г у флаконі і картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.