

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ
(CARBO ACTIVATUS)

Загальна характеристика:

міжнародна назва: carbo activatus;

основні фізико-хімічні властивості: таблетки круглої форми чорного кольору з плоскою поверхнею, без запаху;

склад: 1 таблетка містить: вугілля активованого – 0,25 г;

допоміжні речовини: крохмаль картопляний, тальк.

Форма випуску. Таблетки.

Фармакотерапевтична група. Ентеросорбенти. Код АТС А07В А01.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Вугілля активоване тваринного або рослинного походження. У зв'язку зі спеціальною обробкою вугілля активоване має велику поверхневу активність і здатне адсорбувати гази, алкалоїди, токсини та інші речовини.

Фармакокінетика. Препарат із кишок не всмоктується і повністю виводиться з каловими масами – через 8 – 24 години.

Показання для застосування. Гострі отруєння: побутові, промислові, харчові, лікарськими препаратами, харчовій інтоксикації, отруєнні алкалоїдами, солями важких металів, а також диспепсія, метеоризм.

Спосіб застосування та дози. Вугілля активоване призначають внутрішньо при отруєннях по 20 – 30 г на прийом. Таблетки розтирають у порошок і розбавляють у стакані води. У вигляді аналогічної форми здійснюють також промивання шлунка. В умовах підвищеної кислотності та метеоризму призначають внутрішньо по 1 – 2 г (у стакані води) 3 – 4 рази на добу. При отруєннях застосовують також суміш такого складу: вугілля активованого – 2 частини, таніну та окису магнію – по 1 частині. Призначають у вигляді суспензії (2 столові ложки суміші на 200 мл теплої води).

Курс лікування при гострих захворюваннях складає 3 – 5 днів, при хронічних захворюваннях, які зумвлені ендогенними інтоксикаціями – 10 – 15 днів.

Побічна дія. Запори або проноси. При тривалому застосуванні збіднення організму вітамінами, гормонами, жирами, білками.

Протипоказання. Виразкові ураження органів шлунково-кишкового тракту, шлункові кровотечі.

Передозування. Може спостерігатися поява або посилення запорів, які зникають після зменшення дози.

Особливості застосування. Кал після прийому препарату забарвлюється в чорний колір.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Завдяки адсорбуючим властивостям вугілля активоване здатне зменшувати ефективність лікарських засобів, які приймаються одночасно з ним. Тому препарат приймається за 1 – 1,5 години до та після прийому ліків.

Умови та термін зберігання. Препарат слід зберігати в недоступному для дітей, сухому місці, окремо від речовин і матеріалів, що виділяють пари і гази, при температурі не вище 25 °С.

Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 10 таблеток у контурній безчарунковій або чарунковій упаковці.

Виробник. АТ “Стома”.

Адреса. Україна, 61105, м. Харків, вул. Ньютона, 3.