

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату**ЦЕФПРОМ**  
**(CEFPROME)****Склад:**

діюча речовина: Cefprozime;

1 флакон містить цефпрому сульфат у перерахуванні на цефпром 1 г;

допоміжні речовини: натрію карбонат.

**Лікарська форма.**

Порошок для приготування розчину для ін'єкцій.

**Фармакотерапевтична група.**

Протимікробні засоби для системного застосування. Бета-лактамі антибіотики.

Код АТС J01D A37.

**Клінічні характеристики.****Показання.**

Лікування інфекцій, спричинених чутливими до препарату мікроорганізмами, у т.ч. у пацієнтів з нейтропенією та послабленим імунітетом та при госпітальних інфекціях.

- генералізовані інфекції та інфекції, що потребують інтенсивного лікування: бактеріємія, септицимія;
- інфекції нижніх дихальних шляхів: бронхопневмонія, вогнищева пневмонія, у т.ч. бактеріальна пневмонія;
- ускладнені інфекції сечовивідних шляхів (верхніх і нижніх відділів): пієлонефрит;
- інфекції шкіри і м'яких тканин: целюліт, ранові інфекції.

**Противоказання.**

Підвищена чутливість до антибіотиків пеніцилінового та цефалоспоринового рядів.

Періоди вагітності та годування груддю.

**Спосіб застосування та дози.**

Перед застосуванням проводять шкірну пробу на наявність підвищеної чутливості до антибіотика.

Дозу та тривалість курсу лікування встановлює лікар індивідуально, залежно від тяжкості захворювання, локалізації інфекції, стану функції нирок.

Препарат вводять лише внутрішньовенно (струминно або краплинно).

Застосування для лікування дорослих. Для застосування дорослим з нормальною функцією нирок рекомендований такий добовий дозовий режим препарату:

