

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПІВОНІЇ НАСТОЙКА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 100 мл містять спиртової настоянки трави, кореневищ з коренями півонії незвичайної у спирті етиловому 40 % (1:10);

допоміжна речовина: етанол 40 %.

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина світло-коричневого кольору зі специфічним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ «Біолік».

Україна, 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Леніна, 118.

Фармакотерапевтична група.

Снодійні та седативні засоби. Код АТС N05C M17**.

Трава, кореневища та корені півонії незвичайної містять феноли, дубильні речовини, органічні кислоти. Півонії настойка має спазмолітичні, протисудомні властивості та здатність підвищувати кислотність шлунка.

Показання для застосування.

Функціональні порушення центральної нервової системи (нейроциркуляторна дистонія за гіпертонічним типом, невротичні стани).

Протипоказання.

Артеріальна гіпотензія. Індивідуальна гіперчутливість до біологічно активних речовин, що містяться в лікарській рослинній сировині. Період вагітності і годування груддю. Дитячий вік.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При тривалому прийомі великих доз препарату необхідно контролювати шлункову кислотність у пацієнтів з тенденцією до її підвищення.

Перед застосуванням збовтувати.

Особливі застереження.***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Не рекомендується застосовувати препарат в період вагітності (діє абортивно) або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

У період лікування Півонії настоячкою пацієнту слід утримуватися від керування транспортними засобами та виконання іншої роботи, яка потребує підвищеної уваги, швидкості психічних і рухових реакцій.

Діти.

Досвіду застосування препарату у дітей немає, тому він не рекомендований до застосування у

Спосіб застосування та дози.

Півонії настойку приймають внутрішньо за 10 - 15 хв до їди. Дорослим призначають по 15 - 20 крапель настойки 2 - 3 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначають індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Рекомендована тривалість лікування – 2 тижні, у разі необхідності курс лікування можна повторити після перерви (через 2 - 3 місяці).

Передозування.

При перевищенні рекомендованих доз спостерігаються сонливість, зниження артеріального тиску, запаморочення.

У разі передозування слід припинити застосування препарату і призначити симптоматичну терапію (у відповідності з клінічним станом хворого).

Побічні ефекти.

Артеріальна гіпотензія, сонливість, загальна слабкість, а також місцеві алергічні реакції (почервоніння та висипи на шкірі, свербіж).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат може потенціювати дію седативних і снодійних засобів, транквілізаторів, нейролептиків, антидепресантів із седативною дією.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при кімнатній температурі не вище 15 °С у захищеному від світла місці.

Зберігати у недоступному для дітей місці. В процесі зберігання допускається випадання осаду.

Упаковка.

По 100 мл у флаконах або банках.

Категорія відпуску.

Без рецепта.