

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ДЛЯНОС
(DLIANOS)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: xylometazoline;

1 мл розчину містить ксилометазоліну гідрохлориду 1 мг;

допоміжні речовини: бензалконію хлорид, натрію фосфат, динатрію едетат, натрію дигідрофосфату дигідрат, натрію хлорид, вода очищена.

Лікарська форма. Спрей назальний.

Прозора безбарвна рідина, практично без запаху.

Назва і місцезнаходження виробника.

1. NORRIS MEDICINE LTD/NORRIS MEDICINES Ltd.

Plot № 801/P, G.I.D.C., Істейт, Анклешвар 393002, Гуджарат, Індія/

Plot No. 801/P, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar 393002, Gujarat, India.

2. Сандоз Пвт Лтд/Sandoz Pvt Ltd.

Мумбаї 400018, Індія / Mumbai 400018, India.

Фармакотерапевтична група. Протинабрякові препарати для місцевого застосування при захворюваннях носової порожнини. Симпатоміметики.

Код АТС R01A A07.

Препарат містить у своєму складі ксилометазолін, який належить до групи місцевих судинозвужувальних засобів (деконгестантів) з α -адреноміметичною дією. Ксилометазолін спричиняє звуження кровеносних судин слизової оболонки носа, усуваючи таким чином набряк і гіперемію слизової оболонки носа і носоглотки.

У терапевтичних концентраціях не подразнює слизову, не спричиняє гіперемію. Полегшення носового дихання при ринітах настає через 5-10 хвилин і триває протягом 5-6 годин, проте спазм кровеносних судин зазвичай утримується до 8-12 годин.

При місцевому застосуванні практично не всмоктується, не чинить системної дії.

Показання для застосування. Симптоматичне лікування ринітів різного походження, дренаж виділень при захворюваннях навколоносових пазух, як допоміжний засіб при комбінованій терапії середнього отиту для зняття набряку слизової оболонки порожнини носа; при діагностичних втручаннях (риноскопії).

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату; закритокутова глаукома, трансфеноїдальна гіпофізектомія або наявність в анамнезі трансназальних/трансоральних хірургічних втручань з оголюванням твердої мозкової оболонки.

Особливі застереження. Не слід перевищувати рекомендовані дози та кратність застосування препарату ДЛІАНОС. Не можна застосовувати препарат безперервно протягом тривалих періодів (понад 7-10 днів поспіль). Препарат рекомендований лише у тому разі, коли відомо, що пацієнт добре реагує на симпатоміметичні засоби. З обережністю слід застосовувати спрей, якщо у пацієнтів спостерігається підвищений кров'яний тиск, збільшення передміхурової залози, збільшення щитовидної залози, серцево-судинні захворювання, глаукома та цукровий діабет.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Під час вагітності застосування препарату не рекомендується. Невідомо, чи потрапляє ксилометазолін у грудне молоко. Тому застосування спрею ДЛІАНОС у період годування груддю показане тільки у випадках, якщо на думку лікаря користь від застосування препарату перевищує потенційний ризик.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Застосування дітям віком до 6 років не рекомендовано.

Спосіб застосування та дози. Препарат у формі спрею назального 0,1 % призначають дорослим і дітям від 6 років. Рекомендовано робити по 1 впорскуванню по 1 впорскуванню в кожен носовий хід (при необхідності можна повторити) 2-3 рази на день. Зазвичай достатньо 4 упорскувань на добу.

Інструкція для використання. Зніміть захисний ковпачок. Тримавши розпилювач насадкою догори, розмістіть його розпилювальною голівкою в носовому ході однієї з ніздрів; зробіть впорскування, різко стиснувши розпилювач один раз і, не розтискаючи, вийміть його з носа. Повторіть таке саме впорскування в іншу ніздрю. Під час упорскування слід вдихнути трохи повітря через ніс для досягнення оптимального розповсюдження препарату. Після використання закрийте розпилювач захисним ковпачком.

Передозування. Не повідомлялося про жодний випадок передозування у дорослих. У поодиноких випадках передозування у дітей спостерігалися такі симптоми, як: прискорення пульсу та аритмія, підвищення артеріального тиску, іноді сплутаність свідомості.

Лікування: симптоматичне, пацієнт повинен перебувати під наглядом лікаря.

Побічні ефекти. Іноколи можуть виникати такі побічні ефекти: відчуття печіння, сухості та подразнення слизової оболонки носа, чхання, нудота, головний біль, запаморочення, тимчасові висипання, аритмія, порушення сну, задишка, ангіоневротичний набряк. У поодиноких випадках можливі системні алергічні реакції, транзиторні порушення з боку органів зору.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. При одночасному застосуванні з інгібіторами MAO ксилометазолін може призвести до гіпертонічного кризу. Також він може взаємодіяти з іншими симпатоміметичними лікарськими засобами та -блокаторами.

Термін придатності. 3 роки.

Препарат не слід застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 30 С у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 10 мл препарату у білому поліетиленовому флаконі з розпилювальною голівкою, що закривається нагвинчувальним поліпропіленовим ковпачком із захисною мембраною. По 1 флакону в картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.