

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ХЛОРОФІЛІПТ
(CHLOROPHYLLIPTUM)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: опалесцируюча рідина від світло-зеленого до зеленого кольору, зі специфічним запахом;

склад: 1 мл спрею містить хлорофіліпту екстракту густого – 0,002 г;

допоміжні речовини: спирт етиловий, гліцерин дистильований, твін-80, ніпагін, ніпазол, вода очищена.

Форма випуску. Спрей.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезинфікуючі засоби.

Код АТС D08A X10**.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Хлорофіліпт є сумішшю хлорофілів з листя евкаліпту. Препарат має протимікробну дію, особливо відносно стафілококів, у тому числі пеніциліностійких стафілококів. Хлорофіліпту притаманна антисептична, антибактеріальна та протизапальна дії.

Фармакокінетика. Не досліджена.

Показання для застосування. Опіки, трофічні виразки, ерозії, гострі респіраторні захворювання (ГРЗ), ангіни.

Спосіб застосування та дози. Хлорофіліпт застосовується місцево. При запаленнях органів порожнини рота (ангіни, ГРЗ) дорослим оприскувати верхню частину горла (зіва) двома натискуваннями на клапан флакону 3-4 рази на добу протягом 3-4 днів. При лікуванні ерозій, трофічних виразок, опіків змочити марлеву серветку хлорофіліптом і залишити на поверхні шкіри або слизових оболонках на 15-20 хвилин. Процедуру проводять двічі на добу. Маніпуляції повторюють щоденно протягом 10 днів.

Побічна дія. При застосуванні хлорофіліпту можлива поява алергічних реакцій.

Протипоказання. Індивідуальна несприйнятливність препарату.

Передозування. Можливе посилення побічної дії.

Особливості застосування. Перед застосуванням препарату визначають чутливість до хлорофіліпту, для чого хворий випиває 25 крапель препарату, розчиненого в 1 столовій ложці води. При відсутності через 6-8 годин ознак алергії (набряк губ, слизових оболонок) препарат можна застосовувати. Чутливість до хлорофіліпту у будь-якій формі виготовлення препарату визначають шляхом внутрішнього прийому 0,25 % спиртового розчину хлорофіліпту.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Посилює дію антисептичних препаратів.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі від + 3 °С до + 35 °С, в недоступному для дітей місці. Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Спрей по 15 мл або 30 мл у флаконах.

Виробник. Філія ТОВ “Дослідний завод „ГНЦЛС”.

Адреса. Україна, м. Харків, вул. Воробйова, 8.