

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ФУРАСОЛ
(FURASOL)

Склад:

діюча речовина: фурагін розчинний;
1 пакетик містить фурагіну розчинного 0,1 г;
допоміжна речовина: натрію хлорид.

Лікарська форма. Обполіскувач, порошок.

Фармакотерапевтична група.

Препарати, що застосовуються у разі захворювань горла. Антисептики. Код АТС R02A A20.

Клінічні характеристики.**Показання.**

Місцеве лікування бактеріальних інфекцій ротової порожнини і горла.

Протипоказання.

Підвищена чутливість (алергія) до фурагіну і препаратів нітрофуранового ряду.

Алергічний дерматит.

Період вагітності і годування груддю.

Дитячий вік до 4 років.

Спосіб застосування та дози.

Розчин готують безпосередньо перед застосуванням. Вміст пакетика розчиняють у склянці гарячої води. Теплий розчин застосовують для полоскання 3 - 4 рази на добу. Розчин не зберігати.

Термін лікування – до 3 днів.

Побічні реакції.

Зазвичай Фурасол переноситься добре. В окремих випадках можливі алергічні реакції.

Передозування.

Препарат малотоксичний. Випадки передозування не спостерігались.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовують.

Діти.

Застосування препарату протипоказано дітям віком до 4 років.

Особливості застосування.

Розчин застосовувати відразу після приготування.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

У поєднанні з антибіотиками виявляє виражений синергізм.

При вживанні алкоголю під час лікування Фурасолом зростає ймовірність розвитку шкірних алергічних реакцій.

Фармакологічні властивості.

Фурагін розчинний має широкий спектр антибактеріальної дії проти грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, включаючи штами патогенних стафілококів та інших мікроорганізмів, що резистентні до антибіотиків та інших хіміотерапевтичних засобів. Антибактеріальна дія фурагіну розчинного заснована на пригніченні ферментних систем різних бактерій. У порівнянні з антибіотиками і сульфаніламидами резистентність до фурагіну розчинного розвивається повільно і незначною мірою. Нітрофурані поліпшують лейкопоез і фагоцитарну активність лейкоцитів. При застосуванні на слизові препарат не спричиняє подразливої дії і больових відчуттів.

Фармацевтичні характеристики:

основні фізико-хімічні властивості: крупний порошок оранжево-коричневого кольору.

Термін придатності.

4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 1 г препарату у пакетику з ламінату; по 15 пакетиків у пачці.

Категорія відпуску.

За рецептом.

Виробник.

АТ «Олайнфарм», Латвія.

Місцезнаходження.

Вул. Рупніцу 5, Олайне, LV-2114 Латвія.