

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЕВКАЛІПТА ПРУТОВИДНОГО ЛИСТЯ
(FOLIA EUCALYPTI VIMINALIS)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 пачка містить листя евкаліпта прутовидного 50 г.

Лікарська форма. Листя.

Сухе, подрібнене листя зеленого кольору, запашне, гірке на смак.

Назва і місцезнаходження виробника.

Комунальне підприємство Київської обласної ради "Фармацевтична фабрика".
Україна, м. Київ, вул. Комінтерну, 16.

Фармакотерапевтична група.

Засоби для застосування в стоматології.
Код АТС А01А D11.

Евкаліпта прутовидного листя містять олію ефірну, флавоноїди, речовини дубильні, кислоту елагову, хлорофіл, фенолокислоти. Цей комплекс біологічно активних речовин виявляє антисептичну, протизапальну, болезаспокійливу, в'язучу, репаративну і відхаркувальну дію. Препарати із евкаліпта листя згубно діють на стрептококи, стафілококи, дизентерійну та кишкову палички, гнійних та анаеробних збудників, сприяють швидкому загоєнню ран.

Показання для застосування.

Застосовують зовнішньо у вигляді настою при захворюваннях ротової порожнини і верхніх дихальних шляхів (стоматити, гінгівіти, ларингіти, фарингіти, трахеїти), свіжих та інфікованих ранах, запальних захворюваннях жіночих статевих органів.

Протипоказання.

Індивідуальна чутливість до біологічно активних речовин, що містяться в лікарському засобі.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Відсутні.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Немає обмежень при застосуванні препарату.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Ефективність і безпека застосування препарату дітьми не встановлена.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують у вигляді настою: 10 г (2 столові ложки) листя поміщають в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і настоюють на киплячій водяній бані 15 хв. Охолоджують при кімнатній температурі 45 хв, проціджують, залишок віджимають до процідженого настою. Об'єм настою доводять кип'яченою водою до 200 мл. 1 столову ложку отриманого настою розводять у 200 мл (1 склянка) кип'яченої води і застосовують для інгаляцій та полоскання 3 - 4 рази на день. У гінекологічній та хірургічній практиці застосовують у вигляді примочок, промивань і спринцювань.

Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Передозування.

Не спостерігалось.

Побічні ефекти.

При індивідуальній підвищеній чутливості до препарату можливий розвиток алергічних реакцій (гіперемія, висипання, свербіж та набрякання шкіри). При появі побічних реакцій припинити прийом препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25 °С.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8 - 15 °С не більше 2 діб.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 г у пачках.

Категорія відпуску.

Без рецепта.