

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СТОПАНГІН
(STOPANGIN®)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 мл спрею містить 1,92 мг гексетидину;

допоміжні речовини: олія ефірна анісова, олія ефірна евкаліптова, олія ефірна сасафрасова, олія ефірна з квітів апельсинового дерева, олія ефірна м'яти перцевої, натрію сахаринат моногідрат, левоментол, метилсаліцилат, гліцерин, етанол.

Лікарська форма. Спрей.

Прозора, безбарвна або майже безбарвна рідина зі специфічним запахом, солодкувата на смак. Після розпилення утворює тонко розпилений безбарвний аерозоль.

Назва і місцезнаходження виробника

АЙВЕКС Фармасьютикалз с.р.о., Чеська Республіка.
вул. Остравска 29, а/с 305, Опава-Комаров, 74770.

Фармакотерапевтична група. Лікарські засоби, що застосовують при захворюваннях горла. Антисептики. Код АТС R02A A20.

Стопангін - дезінфекційний засіб з помірною анестезуючою дією. Основний активний компонент – гексетидин – виявляє антисептичну дію. Антимікробна дія гексетидину досягається шляхом пригнічення окислювальних реакцій метаболізму мікробних клітин (антагоніст тіаміну). Дією на гліколітичний процес зменшується окиснення залишків їжі в порожнині рота. Конкурентоздатні інгібітори блокують утворення тіамінінпірофосфату, коензиму, необхідного для процесу життєдіяльності мікроорганізмів. Гексетидин є слабким місцевим анестетиком слизової оболонки. Препарат практично не абсорбується.

Показання для застосування.

- дезінфекція порожнини рота і гортані при запальних і інфекційних захворюваннях: ангіна, фарингіт, гінгівіт, пародонтоз, стоматит, глосит і афти;
- дезінфекція перед та після тонзилектомії, екстракції зубів та інших хірургічних втручань у порожнину рота.
- усунення неприємного запаху з рота.
- додатковий лікарський засіб у лікуванні антибіотиками ангін, які були спричинені стрептококами.

Протипоказання.

- підвищена чутливість до гексетидину та інших компонентів препарату;
- сухий фарингіт атрофічного типу;
- діти віком до 8 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат не слід вдихати!

У зв'язку з цим його можна застосовувати лише дітям старше 8 років та лише у тих випадках, коли вони не чинять опір сторонньому предмету (аплікатору) у роті, та якщо здатні затримувати дихання під час застосування препарату.

Особливі застереження.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Вагітність

Належні дані щодо застосування препарату Стопангін вагітним жінкам відсутні. Препарат не слід застосовувати під час вагітності, за винятком випадків, коли користь для матері перевищує ризик для плода.

Годування груддю

Одержаних даних щодо проникнення гексетидину в материнське молоко недостатньо, щоб оцінити ризик для дитини, тому в період годування груддю слід утримуватись від застосування препарату.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Даний препарат не погіршує здатності керувати автомобілем та працювати з іншими механізмами. Однак водіям не рекомендується керувати автомобілем протягом 30 хвилин після застосування препарату. Препарат містить 80 % об'єму 96 % етанолу. Кожна доза містить до 0,1 г етанолу.

Діти.

Препарат не застосовують дітям віком до 8 років.

Спосіб застосування та дози.

Зняти з флакона захисний ковпачок та насадити аплікатор. Натиснути 2-3 рази, поки розчин не надійде до розпилювача. Затримати дихання та бризнути один раз на відповідну ділянку порожнини горла. Процедуру повторюють 2-3 рази на добу. Препарат слід застосовувати після їди або в проміжках між прийомами їжі.

Препарат не слід вдихати! Термін лікування 6-7 днів

Передозування.

Випадки передозування не описані.

Побічні ефекти.

У виняткових випадках можуть виникнути зміни смакових відчуттів та нюху. Найчастіше можлива поява тимчасового відчуття жару слизової оболонки ротової порожнини, яке досить швидко зникає. У виняткових випадках у людей з підвищеною чутливістю може виникнути алергічна реакція, яка призводить до порушення функції дихання (у місці прямого контакту з'являється гіперемія, набряк, наліт, укривання виразками та крововиливання) у тому числі ларингоспазм, набряк Квінке, бронхоспазм.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодії не описані.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Упаковка. Спрей у пластиковому флаконі об'ємом 30 мл з механічним розпилювачем, аплікатором для ротової порожнини та кришкою, яка захищає розпилювач, в картонній коробці.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Категорія відпуску. Без рецепта.