

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

ХІЛАК (HYLAK)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора, жовто-коричневого кольору рідина з характерним кислуватим карамелеподібним запахом;

склад: 100 мл крапель містять беззародкового концентрату продуктів обміну речовин *Lactobacillus helveticus* DSM 4183 – 103,865 г;

допоміжні речовини: калію моногідрофосфат, натрію моногідрофосфат семиводний, кислота молочна 90%, кислота фосфорна 85%, калію сорбат, кислоти лимонної моногідрат.

Форма випуску. Краплі.

Фармакотерапевтична група. Антидіарейні мікробні препарати. Код АТС А07F А05.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Хілак краплі є препаратом, що нормалізує кишкову флору, рН та водно-електролітний баланс у просвіті кишечника, та водночас таким, що стимулює синтез епітеліальних клітин кишкової стінки.

Завдяки тому, що Хілак містить біосинтетичну молочну кислоту та її буферні солі, нормалізується кислотність у шлунково-кишковому тракті, яка лишається постійною, незалежно від того, підвищену або знижену кислотність має пацієнт.

Введенням до складу Хілак численних продуктів обміну фізіологічних кишкових мікробів (виробників молочної кислоти, а також грампозитивних і грамнегативних симбіонтів тонкого та товстого кишечника) можна зберегти фізіологічні функції слизової оболонки кишечника та сприяти відновленню його нормальної флори.

Летючі кислоти жирного ряду, які містяться в Хілак, роблять можливими не тільки профілактику, але і відновлення ушкодженого кишкового середовища при інфекційних шлунково-кишкових захворюваннях, вони також сприяють всмоктуванню води та важливих електролітів (натрій, хлор).

Хілак скорочує час виведення сальмонел у немовлят після сальмонельозного ентериту. Дія базується на тому, що краплі сприяють росту ацидофільної анаеробної кишкової флори, яка є антагоністом сальмонел.

Фармакокінетика.

Хілак краплі проникають у шлунково-кишковому тракті, нормалізуючи мікрофлору, рН та водно-електролітний баланс у просвіту кишечника. Не всмоктуються в кров. Разом з їжею проходять через усі відділи шлунково-кишкового тракту, змінюючи рН незалежно від того, підвищена або знижена кислотність у пацієнта. Створюють сприятливі умови для покращення всмоктування важливих електролітів (Na, Cl). Виводяться через шлунково-кишковий тракт.

Показання для застосування.

- Відновлення нормальної флори кишечника при дисбіозах;
- запалення травного тракту: ентерит, коліт, синдром старечого кишечника (хронічні, атрофічні ентероколіти, коліти);
- синдром недостатнього травлення (при порушенні травлення вуглеводів, білків);
- підкислення середовища шлунка при зниженій кислотності для її нормалізації;
- розлади з боку травного тракту, викликані зміною клімату (“діарея мандрівника”);
- як супутня терапія при алергічних захворюваннях шкіри (кропив’янка, ендогенно обумовлена хронічна екзема);

— у комплексному лікуванні гострих кишкових інфекцій.

Спосіб застосування та дози.

Хілак краплі слід приймати до або під час прийому їди з достатньою кількістю рідини (за винятком молока). Хілак краплі рекомендується приймати 3 рази на добу:

дорослим і дітям старше 12 років — по 40 — 60 крапель на прийом;

дітям від 2 років — по 20 — 40 крапель на прийом;

дітям до 2 років — по 15 — 30 крапель на прийом.

Після покращання стану добова доза може бути зменшена вдвічі.

Особам, які мають підвищену кислотність шлунка, і як наслідок пов'язану з цим печію, рекомендується обов'язково розподіляти добову дозу на 3 прийоми.

Тривалість лікування залежить від тяжкості перебігу хвороби.

Побічна дія.

У поодиноких випадках може мати місце реакція гіперчутливості у вигляді шкірних реакцій.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до складових препарату.

Передозування.

Випадків передозування у дорослих не спостерігалось.

Якщо дитина випадково прийняла препарат Хілак нерозведеним, може спостерігатися рефлекторне зригування, блювання.

У цьому випадку дитину слід доставити у стаціонар.

Особливості застосування.

Не рекомендується застосовувати Хілак краплі з молоком або молочними продуктами.

Препарат Хілак слід з обережністю призначати хворим з підвищеною кислотністю шлункового соку за наявності рефлюкс-езофагіту.

Препарат Хілак не можна застосовувати без попереднього розведення водою.

Вагітність і лактація. Немає даних щодо будь-яких можливих ризиків для вагітних і немовлят.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами.

Під впливом антацидних засобів можлива нейтралізація молочної кислоти, яка входить до складу Хілак.

Умови та термін зберігання.

Препарат зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Спеціальних умов зберігання після відкриття флакона не вимагається.

Термін придатності — 5 років.

Умови відпуску.

Без рецепта.

Упаковка.

Зовнішня упаковка — картонна коробка.

Внутрішня упаковка — флакон з темного скла по 30 мл, 100 мл.

Виробник. “Меркле ГмбХ”.

Заявник/дистриб’ютор: “ратіофарм Інтернешнл ГмбХ”.

Адреса. 89079, Ульм, Німеччина.