

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ТАУФОН-ДАРНИЦЯ**  
**TAUFONE-DARNITSA**

**Загальна характеристика:**

**міжнародна та хімічна назви:** taurine, 2-аміноетансульфонова кислота;

**основні фізико-хімічні властивості:** прозора безбарвна, рідина, без запаху

**склад:** 1 мл містить 40 мг таурину;

**допоміжні речовини:** ніпагін, вода для ін'єкцій. \_

**Форма випуску.** Краплі очні.

**Фармакотерапевтична група:** Засоби, що застосовують в офтальмології. Трофічні засоби. Тауфон. Код АТС S01X A21

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.** Тауфон-Дарниця містить таурин – сірковмісну амінокислоту, яка утворюється в організмі в процесі перетворень цистеїну. Таурин бере участь у синтезі пластичного матеріалу, внаслідок чого стимулює репаративні і регенеративні процеси при захворюваннях очей дистрофічного характеру та/або патологічних процесів, які супроводжуються різким порушенням метаболізму очних тканин, у тому числі – при травмах ока. Сприяє нормалізації функцій клітинних мембран, оптимізації енергетичних і обмінних процесів, підтримці постійності електролітного складу цитоплазми клітин, гальмуванню синаптичної передачі.

**Фармакокінетика.** Не вивчена.

**Показання для застосування.** Травми та дистрофія рогівки. Катаракта (вікова, діабетична, травматична, променева). Відкритокутова глаукома (разом з тимололом).

**Спосіб застосування та дози.** Відкрити кришку флакона. Закапувати по 1 - 2 краплі 2 - 4 рази на добу в кон'юнктивальний мішок ураженого ока шляхом легкого натискання на дно флакона.

Курс лікування при травмах – 1 місяць, при катарактах – 3 місяці (повторюють з інтервалом 1 місяць).

При глаукомі інстилюють 2 рази на добу за 20 - 30 хвилин до застосування тимололу.

**Побічна дія.** Алергічні реакції, по типу алергічного кон'юктивіту.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до таурину.

**Передозування.** Не описане.

**Особливості застосування.** Відсутні.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** При спільному застосуванні з очними краплями тимололу спостерігається потенційоване зниження внутрішньоочного тиску.

**Умови та термін зберігання.** Зберігають у недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі від 8 С до 15 С

Термін придатності – 1 рік. Термін придатності після відкриття флакона – 28 діб.

**Умови відпуску.** За рецептом.

**Упаковка.** По 5 мл або 10 мл у флаконах з полімерного матеріалу, що закриті кришками-крапельницями.

**Виробник.** ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

**Адреса.** 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.