

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЖОВЧОГІННИЙ ЗБІР № 2

Склад лікарського засобу.

діючі речовини: 1 пачка містить цмину піщаного квіти (40%), дерев'яну траву (20%), м'яти перцевої листя (20%), коріандру плоди (20%) 50 г.

Лікарська форма. Збір.

Суміш, що має барвисте забарвлення, ароматний запах. Смак водної витяжки – гіркий, пряний, охолоджуючий.

Назва і місцезнаходження виробника.

Комунальне підприємство Київської обласної ради "Фармацевтична фабрика".

Україна, м. Київ, вул. Комінтерну, 16.

Фармакотерапевтична група.

Жовчогінні засоби. Код АТС А05А Х10.

Водна витяжка зі збору має жовчогінний ефект. Препарат сприяє підвищенню жовчної секреції, змінює хімізм жовчі (зменшує концентрацію жовчних кислот, підвищує вміст холатів і білірубину в жовчі), збільшує жовчовиділення, виявляє протизапальну, антибактеріальну і спазмолітичну дію, стимулює секреторну функцію шлунка і підшлункової залози, підвищує діурез, діє як кровоспинний засіб.

Показання для застосування. Хронічні холециститу, холангіти, ангіохоліти, з гіпомоторною дискінезією жовчного міхура.

Протипоказання. Обтураційна жовтуха, жовчокам'яна хвороба. Препарат протипоказаний при алергії до будь-якого з його компонентів.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Перед вживанням настій рекомендується збовтувати.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Препарат не рекомендується застосовувати жінкам у періоди вагітності та годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Особливих застережень немає.

Діти. Не застосовувати дітям до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Для приготування настою 1 столову ложку збору кладуть в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) холодної перевареної води, закривають кришкою, нагрівають у киплячій воді (на водяній бані) 15 хвилин, потім настоюють при кімнатній температурі 45 хвилин і проціджують. Сировину, що залишилася, віджимають до процідженого настою. Об'єм останнього доводять перевареною водою до об'єму 200 мл. Дорослі та діти старше 12 років приймають внутрішньо за 30 хвилин до їди, по ½ склянки (100 мл) 3 рази на день до досягнення стабільного лікувального ефекту. Перед вживанням настій збовтують.

Передозування. Не виявлено.

Побічні ефекти. В осіб з підвищеною чутливістю на компоненти препарату можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії. Не встановлена.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С. Готовий настій зберігають при температурі 8–15°С не більше 2-х діб.

Упаковка. По 50 г в пачках.

Категорія відпуску. Без рецепта.