

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
БРОНХОМЕД ЮНІОР
(BRONCHOMED JUNIOR)

Склад лікарського засобу.

Діючі речовини: 5 мл сиропу містять екстракти:

Adhatoda vasica (адатода васика) 3:1

.....30 мг,

Glycyrrhiza glabra (солодка гола) 3:1

.....20 мг,

Curcuma longa (куркума довга) 7:1

.....10 мг,

Ocimum sanctum (васильок священний) 5:1

.....10 мг,

Zingiber officinale (імбир справжній) 4:1

.....10 мг,

Solanum xanthocarpum (пасльон) 5:1

.....5 мг,

Piper longum (перець довгий) 3:1

.....5 мг,

Elettaria Cardamomum (кардамон справжній) 6:15

мг;

допоміжні речовини: цукроза; сорбіту розчин 70% (Е 420); камедь гуарова; ментол; пропіленгліколь; натрію бензоат (Е 211); натрію пропілпарабен (Е 217); бронопол; карамель; метилпарабен (Е 218); кислота лимонна, моногідрат; ароматизатор фенхеля (солодкого кропу); ароматизатор малиновий солодкий; вода очищена.

Лікарська форма. Сироп.

Сироп коричневого кольору з характерним ароматом і специфічним солодким смаком.

Назва і місцезнаходження виробника.

Аджіо Фармас' ютікалс Лтд.

А-38, Нанджіот Індастріал Естейт, Мумбаї – 400 072, Індія.

Фармакотерапевтична група. Комбіновані препарати для застосування при кашлі та застудних захворюваннях. Код АТХ R05X.

Дія препарату обумовлена складом діючих компонентів. Бронхомед юніор, сироп, чинить муколітичну (сприяє розрідженню і відходженню мокротиння), протинабрякову (зменшує гіперемію і набряк слизової оболонки верхніх дихальних шляхів), спазмолітичну (зменшує бронхоспазм, полегшує дихання при запальних захворюваннях дихальних шляхів, сухому кашлі тощо), протикашлеву (механізм дії базується на зниженні гіперактивності дихального центру), протизапальну (зменшує вираженість запального процесу в слизовій оболонці дихальних шляхів), седативну (нормалізує психофізіологічні реакції, усуває занепокоєння, дискомфорт при бронхоспазмі), антигістамінну, гіпотермічну, місцеву антисептичну дію.

Показання для застосування.

Симптоматична терапія при запальних захворюваннях дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем, таких як: фарингіт, ларингіт, трахеїт, бронхіт, пневмонія, початкові стадії коклюшу; хронічні захворювання органів дихання: «бронхіт курців», професійний «лекторський» ларингіт.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату, виражені порушення функції печінки та нирок, дитячий вік до 3 років, вагітність.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Одночасно за показаннями показано застосування протимікробних засобів.

Пацієнтам, які хворіють на цукровий діабет, необхідно враховувати, що сироп містить 1,5 г цукру в 5 мл (у 1 чайній ложці).

Особливі застереження.**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Препарат протипоказаний для застосування у період вагітності, оскільки до його складу входить екстракт солодки голої. Безпека застосування препарату в період годування груддю не досліджувалась. Застосування препарату жінками, які годують груддю, можливо тільки в тому випадку, коли очікувана користь для матері перевищує можливий ризик для дитини, або на час лікування слід припинити годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не описана.

Діти.

Препарат не застосовують у дітей віком до 3 років.

Спосіб застосування та дози.

Дітям 3-5 років – по 1/2 чайної ложки (2,5 мл) 3 рази на день, після їди.

Дітям 6-14 років – по 1/2-1 чайної ложки (2,5-5мл) 3 рази на день, після їди.

Дорослим і дітям старше 14 років – по 1-2 чайні ложки (5-10 мл) 3 рази на день, після їди.

Для точного дозування використовуйте мірний ковпачок, що знаходиться в упаковці.

Курс лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування.

У разі передозування можливе відчуття дискомфорту в епігастральній ділянці, нудота, блювання.

Лікування: промивання шлунка, симптоматична терапія.

Побічні ефекти.

З боку травного тракту: нудота, діарея, диспепсія.

Алергічні реакції: шкірні висипання, почервоніння шкіри, свербіж.

Метаболічні розлади: порушення водно-електролітного балансу (поява набряків).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Будь-які лікарські взаємодії не виявлені.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці. Зберігати в щільно закритій упаковці.

Упаковка. По 100 мл сиропу у флаконах. По 1 флакону у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.