

**ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату**

БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: брильяновий зелений;
100 мл розчину містять брильянового зеленого 1 г;
допоміжна речовина: етанол 60 %.

Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 %.

Рідина інтенсивно зеленого кольору із запахом спирту.

Назва і місцезнаходження виробника.

Державне підприємство «Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України».

Україна, м. Київ, вул. Зрошуvalна, 15а.

Фармакотерапевтична група.

Антисептичні та дезінфікуючі засоби.
Код ATC D08A X08**.

Антисептичний засіб для зовнішнього та місцевого застосування. Чинить антимікробну дію. Препарат активний відносно грампозитивних бактерій.

Препарат місцевої дії. Даних про всмоктування у кров та участь у метаболічних процесах організму не виявлено.

Показання для застосування.

Гнійно-запальні процеси шкіри (піодермія, фурункульоз, карбункульоз, блефарит) легкої форми, і також обробка операційного поля, шкірних покривів після операцій та травм.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не допускати потрапляння препарату в очі.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Особливі застереження.

Не слід допускати потрапляння розчину на слизові оболонки, оскільки спирт, що міститься в препараті, може спричинити опіки, сильне подразнення. Активність препарату суттєво зменшується у присутності сироватки крові.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Літи.

Застосовують.

Спосіб застосування та дози.

Наносять на поверхню шкіри, при порушенні її цілісності охоплюють навколошні здорові тканини. При захворюваннях очей змазують краї повік.

Передозування.

Не спостерігалося.

Побічні ефекти.

Алергічні реакції (свербіж, крапив'янка). При попаданні розчину на слизову оболонку ока виникає печіння, слізотеча, можуть з'явитися опіки.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування, які містять органічні сполуки, може денатурувати білки, утворювати нові сполуки.

Не сумісний з дезінфікуючими препаратами, які містять активний йод, хлор, луги (в тому числі розчин аміаку).

При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікарю.

Термін придатності.

2 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в захищенному від світла місці при температурі не вище 15 °C.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 мл або 25 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.