

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
КЕТОТИФЕН
(КЕТОТИФЕН)

Общая характеристика:

международное и химическое название: кетотифен, 4,9-дигидро-4-(1-метил-4-пиперидилиден)-10Н-бензо[4,5]циклогепта[1,2-в]тиофен-10-он(гидрофумарат);

основные физико-химические свойства: прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная или со слегка желтоватым оттенком жидкость;

состав: 1 мл содержит: кетотифен (в форме фумарата) – 0,25 мг;

вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, натрия хлорид, полиглюкин сухой, трилон Б, натрия гидроокись, лимонная кислота, вода очищенная.

Форма выпуска. Капли глазные.

Фармакотерапевтическая группа. Противоаллергические средства, применяемые в офтальмологии. Код АТС S01G X08.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика. Противоаллергическое, мембранстабилизирующее, антигистаминное средство. Тормозит высвобождение гистамина, лейкотриенов, лимфокинов и других биологически активных веществ из тучных клеток и базофилов. Неконкурентно блокирует H₁-гистаминовые рецепторы, ингибирует фосфодиэстеразу, повышает уровень цАМФ в клетках. Подавляет сенсibilизацию эозинофилов рекомбинантными цитокинами человека и их накопление в органах-мишенях.

Фармакокинетика. Не изучена.

Показания к применению. Профилактика и лечение острого, подострого и хронического аллергического конъюнктивита и кератоконъюнктивита, сезонного (весеннего) конъюнктивита.

Способ применения и дозы. Взрослым и детям старше 12 лет по 1 капле в каждый глаз 2 раза в сутки.

Профилактическое введение при подострых и хронических процессах следует начинать за 3 недели до контакта с аллергеном. Лечение продолжают в течение всего времени воздействия аллергенов.

Длительность применения зависит от вида и тяжести заболевания.

Побочное действие. Чувство жжения и покалывания в глазах, нечеткость зрения непосредственно после закапывания. Раздражение слизистой оболочки глаза, кожная сыпь вокруг глаз.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к кетотифену и другим компонентам препарата, беременность. Дети до 12 лет.

Передозировка. Случаи передозировки не установлены.

Особенности применения. При остром воспалении и в период обострения хронического процесса возможно применение препарата в сочетании с кортикостероидами. Пациент должен быть предупрежден о необходимости регулярного применения препарата. Лечение начинают до контакта с аллергеном и продолжают весь период действия аллергена.

Применение препарата в период кормления грудью рекомендуется только по назначению врача.

При использовании глазных капель нельзя пользоваться мягкими контактными линзами в связи с наличием в составе бензалкония хлорида. Жесткие контактные линзы следует вынуть из глаз непосредственно перед закапыванием капель и вставить не ранее чем через 15 минут после применения препарата.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. В течение некоторого времени после закапывания в глаза следует воздерживаться от выполнения работы, требующей повышенной внимания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. При одновременном применении кетотифена и антигистаминных препаратов возможен эффект потенцирования.

Одновременное применение с пероральными противодиабетическими препаратами увеличивает возможность развития тромбоцитопении.

Условия и сроки хранения. Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре от 15 С до 25 С. Срок годности – 2 года.

Условия отпуска. По рецепту.

Упаковка. По 5 мл во флаконах со стерильной крышечкой-капельницей.

Производитель. Филиал ООО «Опытный завод «ГНЦЛС».

Адрес. Украина, 61057, г.Харьков, ул. Воробьева, 8.