

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ НАСТОЙКА**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* 1 флакон містить суміш м'ятної олії та настойки листя м'яти перцевої (1 : 10) 25 мл ;  
*допоміжна речовина:* етанол 90 %.

**Лікарська форма.** Настойка.

Прозора рідина зеленого кольору із запахом м'яти перцевої. При зберіганні допускається наявність осаду.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Комунальне підприємство "Луганська обласна "Фармація", Фармацевтична фабрика.  
Україна, 91020, м. Луганськ, Степовий тупик, 2.

**Фармакотерапевтична група.**

Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту. Код АТС А04 АD20\*\*.

Олія м'яти перцевої (містить до 70 % ментолу та його ефірів) та інші біологічно активні речовини, що містяться в листі м'яти перцевої (кетон-ментон, олеанолова та урсолова кислоти, флавоноїдні глікозиди), стимулюючи чутливі рецептори слизових оболонок ротової порожнини та шлунка, рефлекторним шляхом зменшують відчуття нудоти і запобігають блюванню, а також чинять помірну спазмолітичну, заспокійливу та жовчогінну дію.

**Показання для застосування.**

Нудота, блювання, розлади травлення, стенокардія, невралгічні болі.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Бронхіальна астма і спазмофілія. Період вагітності і годування груддю. Дитячий вік до 12 років.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Відсутні.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

М'яти перцевої настойка містить спирт етиловий, тому препарат не застосовують у період вагітності і годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Через вміст у препараті спирту етилового слід утриматись від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

**Діти.**

Не рекомендується застосовувати М'яти перцевої настойку дітям віком до 12 років, оскільки до складу препарату входить спирт етиловий.

**Спосіб застосування та дози.**

Препарат приймають внутрішньо до їди. Дорослим і дітям старше 12 років призначають по 10 - 15 крапель настойки 3 - 4 рази на день. Тривалість лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання та індивідуальної чутливості до препарату.

**Передозування.**

Повідомлення відсутні.

**Побічні ефекти.**

Можливі алергічні реакції (почервоніння шкіри, висипи, свербіж).

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не виявлена.

**Термін придатності.**

3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.  
Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 25 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.