

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

МУКАЛТИН®
(MUCALTIN)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 таблетка містить мукалтину 50 мг;

допоміжні речовини: кальцію стеарат, натрію гідрокарбонат, кислота винна.

Лікарська форма. Таблетки.

Таблетки сірувато-буроватого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою і фаскою.

Назва і місцезнаходження виробника.

АТ «Галичфарм».

Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.

Фармакотерапевтична група. Відхаркувальні засоби. Код АТС R05C A05.

Мукалтин – ефективний відхаркувальний засіб, дія якого забезпечується секретолітичними та бронхолітичними властивостями. Препарат чинить помірну протикашльову дію, зменшує кількість нападів кашлю та їх інтенсивність. Має пом'якшувальну, протизапальну та обволікаючу властивості. Нормалізує змінену бронхолегеневу секрецію, покращує виділення мокротиння: зменшує його в'язкість та адгезивні властивості, полегшує просування мокротиння з нижніх у верхні відділи дихальних шляхів та його відхаркування.

Показання для застосування.

Кашель при гострих та хронічних захворюваннях дихальних шляхів: бронхіти, пневмонії, бронхоекстатична хвороба, бронхіальна астма, туберкульоз легенів з явищами неспецифічного бронхіту.

Противпоказання.

Підвищена чутливість до мукалтину або до інших компонентів препарату.

Особливі застереження.

Іноді у пацієнтів із хронічними запальними захворюваннями легень на початку лікування Мукалтином може підвищуватись в'язкість мокротиння за рахунок відокремлення мокротиння, що назбиралося у бронхіальному дереві та містить велику кількість детриту, білків і запальних елементів. Тому при дифузному ураженні бронхів, значних змінах фізико-хімічних властивостей мокротиння і зниженні мукоциліарного транспорту терапію Мукалтином необхідно поєднувати з призначенням муколітичних препаратів (бромгексину та інших).

Доцільно приймати разові дози препарату кожні 4 години.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Досвід застосування препарату під час вагітності та у період годування груддю відсутній.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Препарат не впливає на керування автотранспортом або роботу з іншими небезпечними механізмами.

Діти. Препарат застосовують дітям віком старше 1 року.**Спосіб застосування та дози.**

Дорослим і дітям віком старше 12 років призначають по 1-2 таблетки 3-4 рази на добу до їди. Разові дози для дітей, залежно від віку, становлять: 1-3 роки – 1 таблетка, 3-12 років – 1-2 таблетки.

При застосуванні дітям препарат можна розчинити в 1/3 склянки теплої води, за бажанням додавши цукровий або фруктовий сироп.

Курс лікування – від 7 днів до 1-2 місяців, залежно від форми захворювання.

Передозування.

При застосуванні вказаних терапевтичних доз препарату передозування неможливе. При довготривалому застосуванні чи перевищенні вказаних доз можуть виникнути нудота та блювання.

Терапія – симптоматична.

Побічні ефекти.

У деяких випадках можливе виникнення алергічних реакцій у вигляді кропив'янки, свербіжу шкіри.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

На даний момент дані про лікарські взаємодії Мукалтину відсутні. Не призначати одночасно з препаратами, які пригнічують кашель (кодеїн).

Мукалтин можна одночасно приймати з іншими протикашльовими та відхаркувальними засобами.

Термін придатності. 4 роки.**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 8 °С до 15 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Таблетки №10 у стрипі або таблетки №30 у контейнері з контролем першого розкриття.

Категорія відпуску. Без рецепта.