

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату

ЕНГИСТОЛ
(ENGYSTOL)

Склад:

діючі речовини: 1,1 мл містить Vincetoxicum hirundinaria D6 – 6,6 мкл, Vincetoxicum hirundinaria D10 – 6,6 мкл, Vincetoxicum hirundinaria D30 – 6,6 мкл, Sulfur D4 – 3,3 мкл, Sulfur D10 – 3,3 мкл;
допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Клінічні характеристики.**Показання.**

Гострі та хронічні інфекційні захворювання вірусного походження (гепатит, цитомегаловірусна інфекція, герпес, бронхіт, пневмонія, коклюш, грип, ГРВІ); нейродерміт, екзема, ендокардит, міокардит, захворювання нирок, ревматичні захворювання.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дорослим і дітям віком від 6 років – 1 ампула по 1,1 мл.

Застосовувати 1-3 рази на тиждень у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньошкірних (в акупунктурні точки), внутрішньовенних (струминно) ін'єкцій або перорально (розчинити разову дозу в 50 мл води та випити протягом доби, затримуючи на кілька секунд у роті).

У гострих випадках – 1 ампула щоденно протягом 3-5 днів.

Курс лікування: 2-5 тижнів.

Побічні реакції.

У поодиноких випадках можуть виникати висипання на шкірі або свербіж, у такому випадку необхідно припинити застосування препарату і звернутися до лікаря. Також можливі алергічні реакції, ангіоневротичний набряк, зміни в місці введення.

Передозування.

Не відзначалось.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Випадки негативного впливу невідомі.

Діти.

Препарат застосовують для лікування дітей старше 6 років.

Особливості застосування.

Відсутні.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

механізмами.

Невідома.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Препарат чинить імунокоригуючу (непряму протівірусну), протизапальну, дезінтоксикаційну, регенеруючу SH-групи ферментів при інтоксикаціях дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації його функцій.

Фармакокінетика. Для гомеопатичних препаратів не визначається.

Фармацевтичні характеристики.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин без запаху.

Несумісність. Невідома.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

5 ампул та 100 (5x20) ампул по 1,1 мл у картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Місцезнаходження.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.