

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату

ЛІМФОМІОЗОТ Н
(LYMPHOMYOSOT N)

Склад:

діючі речовини: 1,1 мл містить Myosotis arvensis D3 – 0,55 мг, Veronica officinalis D3 – 0,55 мг, Teucrium scorodonia D3 – 0,55 мг, Pinus sylvestris D4 – 0,55 мг, Gentiana lutea D5 – 0,55 мг, Equisetum hiemale D4 – 0,55 мг, Smilax D6 – 0,55 мг, Scrophularia nodosa D3 – 0,55 мг, Calcium phosphoricum D12 – 0,55 мг, Natrium sulfuricum D4 – 0,55 мг, Fumaria officinalis D4 – 0,55 мг, Levothyroxinum D12 – 0,55 мг, Araneus diadematus D6 – 0,55 мг, Geranium robertianum D4 – 1,1 мг, Nasturtium officinale D4 – 1,1 мг, Ferrum iodatum D12 – 1,1 мг;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Клінічні характеристики.

Показання.

Запальні та дистрофічні процеси різної локалізації (переважно у лімфатичних судинах і вузлах), алергічні захворювання.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Можливість застосування препарату при захворюваннях щитовидної залози вирішується за попередньою консультацією лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дорослим і дітям віком від 6 років – 1,1 мл. Застосовувати 1-3 рази на тиждень у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньошкірних і внутрішньовенних ін'єкцій, а також в акупунктурні точки або перорально (розчинити разову дозу в 50 мл води та випити протягом доби, затримуючи на кілька секунд у роті). У гострих випадках – 1 ампула щоденно протягом 3-5 днів.

Курс лікування: 3-6 тижнів.

Побічні реакції.

У поодиноких випадках можуть виникати реакції гіперчутливості (або анафілактичні реакції), а також зміни в місці введення, нудота, запаморочення, головокружіння, пітливість, почервоніння обличчя, загальна слабкість.

Передозування.

Не відзначалось.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Випадки негативного впливу невідомі.

Діти.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

