

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ГЛОДУ ПЛОДИ
(FRUCTUS CRATAEGI)

Загальна характеристика:

міжнародна назва: Crataegus;

основні фізико-хімічні властивості: плоди – яблукоподібні, кулясті або еліпсоїдальні, тверді, зморшкуваті, зверху з кільцевим випинанням, утвореним чашолистками, що зсохлися, колір плодів від жовтогарячого та бурувато-червоного до темно-бурого;

склад: глоду плоди.

Форма випуску. Плоди.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в кардіології.

Код АТС С01Е В04.

Фармакологічні властивості. Плоди глоду містять аміни (холін, ацетилхолін), бета-каротин, вітамін К, антоціани, цукри, кверцетин, стерини, флавоноли, кислоту аскорбінову, пектини, сорбіт та ін.

Препарати із плодів глоду посилюють кровопостачання в коронарних судинах серця і в судинах мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів, незначною мірою посилюють скорочення серцевого м'яза і зменшують збудливість останнього, мають заспокійливу дію, нормалізують артеріальний тиск. Препарат малотоксичний, в організмі не кумулює.

Показання для застосування. Функціональні розлади серцевої діяльності, ангіоневрози, а також (як доповнення до базисної терапії) легкі форми миготливої аритмії і пароксизмальної тахікардії.

Спосіб застосування та дози. 16 г (1 столова ложка) плодів кладуть в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і нагрівають у гарячій воді (на водяній бані) 15 хв, охолоджують 45 хв при кімнатній температурі, проціджують, і сировину, що залишилася, віджимають до процідженого настою. Об'єм одержаного настою доводять кип'яченою водою до початкового об'єму (200 мл).

Дорослі і діти старше 14 років приймають внутрішньо по 1/3-1/2 склянки 2-3 рази на добу до прийому їжі.

1 фільтр-пакет вмістом 4 г кладуть у скляний або емальований посуд, заливають 100 мл (1/2 склянки) окропу, закривають і настоюють 15 хвилин. Дорослі і підлітки приймають внутрішньо по 100 мл (1/2 склянки) 3 рази на добу за 30 хвилин до прийому їжі.

Тривалість прийому зумовлена формою і вираженістю захворювання, досягнутим ефектом, характером терапії (моно- або комплексна).

Побічна дія. Сонливість, уповільнення пульсу.

Протипоказання. Виражені артеріальна гіпотензія і брадикардія.

Передозування. При передозуванні препарату із плодів глоду виникають сонливість, уповільнення пульсу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не виявлена.

Умови та термін зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при кімнатній (15-25 °С) температурі. Приготовлений настій – у прохолодному місці, не більше 2 діб.

Термін придатності - 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 50 г у пакетах, пачках; по 4 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачках.

Виробник. ЗАТ фармацевтична фабрика "Віола".

Адреса. Україна, м. Запоріжжя, 69063, вул. Кірова, 75.