

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ГЛОДУ НАСТОЙКА
(TINCTURA CRATAEGI)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина червоно-коричневого або червоно-фіолетового або вишневого кольору;
склад: 1 флакон містить настойки плодів глоду (1:10) 25 мл або 80 мл;
допоміжні речовини: спирт етиловий 70 %.

Лікарська форма. Настойка.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на серцево-судинну систему.
Код АТС С01ЕВ04.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Біологічно-активні речовини, що містяться в плодах глоду (флавоноїди, холін, ацетилхолін, дубильні речовини, фітостерини, тритерпенові кислоти) посилюють кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що призводить до певного посилення скорочень серцевого м'яза. Препарат добре всмоктується при прийомі внутрішньо. Ефект настає через 30 хвилин - 1 годину.
Фармакокінетика. Не вивчалася.

Показання для застосування. Функціональні розлади серцево-судинної системи (нейро-циркуляторна дистонія), як допоміжний лікарський засіб при легких формах порушень серцевого ритму (миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія).

Спосіб застосування та дози. Застосовують внутрішньо до їди. Дорослим рекомендується приймати по 20 крапель настойки, дітям старше 12 років - із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 рази на день.
Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання та індивідуальної чутливості до препарату.

Побічна дія. Сонливість, уповільнення серцевого ритму, алергічні реакції (почервоніння та висипи на шкірі, свербіж).

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Передозування. Можливе виникнення сонливості, брадикардії. Лікування симптоматичне.

Особливості застосування. Препарат не рекомендують приймати під час їди, щоб уникнути взаємодії з її компонентами.
Безпека та ефективність застосування глоду настойки у дітей не встановлені, тому застосовувати препарат у дітей віком до 12 років не рекомендується.
Вагітність і годування груддю. Безпека та клінічна ефективність препарату при вагітності та в період годування груддю не вивчалися, тому призначати його слід з урахуванням співвідношення ризик/користь.
Вплив на здатність керувати автомобілем або працювати зі складними механізмами. Препарат містить етиловий спирт. У період застосування препарату слід утриматись від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Взаємодія з лікарськими засобами. Глоду настойка може потенціювати дію серцевих глікозидів та антиаритмічних препаратів. Застосування із солями алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів.

Умови та термін зберігання. У прохолодному (8 - 15 °С), захищеному від світла та недоступному для дітей місці. При зберіганні допускається випадання осаду.
Термін придатності - 4 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. У флаконах по 25 мл або по 80 мл.

Виробник. ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола".

Адреса. Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.