

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГРИЦИКІВ ТРАВА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: трава грициків.

Лікарська форма. Трава.

Шматочки листя, стебел і суцвіть різної форми, окремі квітки та плоди. Колір стебел, листя і плодів – зелений, квіток – білуватий. Запах слабкий. Смак гіркуватий.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Фармацевтична фабрика «Віола».

Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група.

Препарати, що стимулюють тонус та скорочувальну активність міометрію.

Код АТС G02A X.

Фармакологічні властивості. Трава грициків містить флавоноїди (рутин, лютеолін-7-рутинозид, лютеолін-7-глюкозид), дубильні речовини, аміни (холін, ацетилхолін, тирамін та інші), сапоніни, кислоти органічні (фумарову, лимонну, яблучну, винну), кислоту аскорбінову, олію ефірну, вітаміни А, В₂, К. Цей комплекс біологічно активних речовин виявляє кровоспинну, в'язучу, протизапальну, гіпотензивну, сечогінну та жовчогінну дію. Водні витяжки з трави грициків посилюють скорочувальну діяльність гладкої мускулатури матки, активізують моторику шлунка та прискорюють перистальтику кишечника.

Показання для застосування.

Атонії матки, маткові кровотечі.

Протипоказання.

Вагітність; підвищене згортання крові; індивідуальна чутливість до біологічно активних речовин, що містяться в лікарському засобі.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Перед вживанням настій рекомендується збовтувати.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Безпека та ефективність застосування Грициків трави у період вагітності не встановлені. Тому не рекомендується призначати препарат вагітним.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Не рекомендується застосовувати дітям.

Спосіб застосування та дози.

10 г (2 столові ложки) трави вміщують в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і настоюють на киплячій водянній бані 15 хв. Охолоджують при кімнатній температурі 45 хв, проціджують, залишок віджимають до процідженого настою. Об'єм настою доводять кип'яченою водою до 200 мл. Приймають у теплому вигляді по 1 столовій ложці 4 - 5 разів на день після їди.

Тривалість курсу лікування визначає лікар з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Передозування.

Не виявлено.

Побічні ефекти.

Не виявлена.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі 15 - 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 75 г у пакетах, пачках.

Категорія відпуску.

Без рецепта.