

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КРУШИНИ КОРА
(CORTEX FRANGULAE)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: шматочки кори різної форми, колір кори з зовнішньої поверхні темно-бурий, сіро-бурий, темно-сірий або сірий, з внутрішньої – жовтувато-оранжевий або червоно-бурий;

склад: кора крушини.

Форма випуску. Кора.

Фармакотерапевтична група. Проносні засоби. Код АТС А06А В07.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Крушини кора містить антраглікозиди франгулін, глікофрангулін, франгулаемодин, хризофанову кислоту, дубильні речовини, органічні кислоти, ефірну олію, цукри, алкалоїди, чинить специфічну м'яку проносну дію, обумовлену антраглікозидами і хризофановою кислотою. При цьому посилюються перистальтичні рухи товстого кишечника, сповільнюється всмоктування його слизовою оболонкою рідини та електролітів. Проносний ефект звичайно настає через 8-12 год після прийому препаратів крушини.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Показання для застосування. Звичні запори.

Спосіб застосування та дози.

2 столові ложки кори кладуть в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закривають кришкою, нагрівають на киплячій водяній бані при частому помішуванні 30 хв, охолоджують 10 хв при кімнатній температурі, проціджують; залишок віджимають. Об'єм одержаного відвару доводять кип'яченою водою до початкового об'єму 200 мл.

Застосовують внутрішньо на ніч. Дорослі приймають 1/2 склянки, діти 12-15 років – 1/4 склянки, підлітки 15-18 років – 1/3 склянки.

2 фільтр-пакети кладуть у скляний або емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) окропу, закривають і настоюють 15 хвилин. Приймають за вищенаведеною схемою.

Тривалість курсу лікування залежить від досягнутого терапевтичного ефекту та переносимості препарату.

Побічна дія. При передозуванні можливі колікоподібний біль у животі, тенезми, відчуття дискомфорту.

Противпоказання. Запори нейрогенного та ендокринного походження, спастичні запори, кишкова непрохідність, кровотечі зі шлунково-кишкового тракту, синдром гострого живота, запальні процеси у черевній порожнині, гострі пропасні стани, вагітність, період годування груддю, дитячий вік до 12 років.

Передозування. При передозуванні можливі колікоподібний біль у животі, тенезми, відчуття дискомфорту.

Особливості застосування. Тривале застосування призводить до звикання та ослаблення або відсутності проносного ефекту.

Безпечність та ефективність застосування крушини кори у дітей віком до 12 років не встановлені.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не відома.

Умови та термін зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при кімнатній (15 - 25 °С) температурі; приготовлений відвар (настій) – у прохолодному (8 - 15 °С) місці не більше 2 діб.

Термін придатності - 5 років.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 50 г у пакетах, пачках; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачці.

Виробник. ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола".

Адреса. Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75,