

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
АНІСОВА ОЛІЯ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: oleum anisi;
1 флакон містить анісової олії 10 мл.

Лікарська форма. Олія.

Безбарвна або злегка забарвлена в жовтуватий колір оліїста рідина з характерним запахом плодів анісу і солодкуватим смаком.

Назва і місцезнаходження виробника.

Комунальне підприємство Київської обласної ради «Фармацевтична фабрика».
Україна, 01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код АТС R05C A21*.

Олія з плодів анісу звичайного (*Anisum vulgare Gaertn.*, *Pimpinella anisum L.*) містить анетол (не менше 80 %), анісальдегід, анісову кислоту та деякі інші біологічно активні речовини.

Препарати анісу мають відхаркувальну та проносну дію.

Показання для застосування. Захворювання дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем (гострі та хронічні бронхіти, бронхопневмонія, бронхоектатична хвороба), запори.

Протипоказання. Препарат протипоказаний при індивідуальній підвищеній чутливості до біологічно активних речовин, що містяться в лікарській рослинній сировині. Не призначають дітям віком до 1 року.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано, оскільки досвід застосування відсутній.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або при роботі з іншими механізмами. Особливих застережень немає.

Діти. Не призначають дітям віком до 1 року.

Спосіб застосування та дози. Анісову олію приймають внутрішньо після попереднього розведення у теплій перевареній воді (2-3 краплі олії на ¼ склянки води).

Приготовлений розчин рекомендують вживати теплим за 30 хвилин до їжі.

Дорослим і дітям старше 12 років призначають по ¼ склянки розчину 3–4 рази на день, дітям віком від 1 до 12 років рекомендують вживати від 1 чайної до 2 столових ложок розчину 3 рази на день (необхідна консультація лікаря щодо режиму дозування).

Тривалість курсу лікування визначають індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Передозування. Тривале застосування анісової олії або перевищення рекомендованих доз може призвести до розвитку діареї.

У разі передозування слід припинити лікування і вжити заходів симптоматичної та підтримуючої терапії (у відповідності з клінічним станом хворого).

Побічні ефекти. При індивідуальній підвищеній чутливості до препарату можливий розвиток алергічних реакцій (висипи, свербіж, гіперемія, набрякання шкіри та бронхоспазм).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Взаємодія препарату з іншими лікарськими засобами невідома. Не застосовувати одночасно з препаратами, які мають протилежну фармакологічну дію та під час лікування гармональними лікарськими засобами.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати у захищеному від світла, та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 15 °С.

Не можна застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Упаковка. По 10 мл у флаконах-крапельницях.

Категорія відпуску. Без рецепта.