

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 100 г препарату містять: 1 г йоду, 2 г калію йодиду, 94 г гліцерину;  
*допоміжна речовина:* вода очищена.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування.

Прозора, сиропоподібна рідина червонувато-бурого кольору, із характерним запахом йоду.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Державне підприємство «Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України».

Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15а.

**Фармакотерапевтична група.**

Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики.

Код АТС R02A A20.

Люголя розчин з гліцериним чинить бактерицидну дію за рахунок вмісту в ньому вільного йоду. Препарат чинить протимікробну дію на грампозитивні та грамнегативні бактерії, у тому числі на стрептококи, стафілококи, кишкову паличку, клебсієли, вульгарний протей.

**Показання для застосування.**

Запальні захворювання слизових оболонок глотки та гортані: ларингіт, тонзиліт, фарингіт.

**Противоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Тяжкі захворювання печінки та нирок. Період вагітності і годування груддю. Дитячий вік до 5 років.

**Належні заходи з безпеки при застосуванні.**

Не допускати потрапляння препарату в очі.

*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.*

**Особливі застереження.**

Відсутні.

**Спосіб застосування та дози.**

Для зовнішнього застосування!

Тампоном, змоченим препаратом, змащують уражені слизові оболонки глотки та гортані 3 - 4 рази на день.

Тривалість курсу лікування залежить від перебігу захворювання та його тяжкості.

**Передозування.**

Можлива поява йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слъзотеча, слиновиділення, висипи на шкірі, м'язова слабкість, загальмованість).

*Лікування.* негайне припинення застосування препарату та симптоматична терапія.

**Побічні ефекти.**

При тривалому застосуванні можуть з'явитися явища йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слъзотеча, слинотеча, висипи на шкірі, м'язова слабкість, загальмованість).

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не застосовувати одночасно з розчином перекису водню та іншими дезінфікуючими засобами.

**Термін придатності.**

3 роки.

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.*

**Умови зберігання.**

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 25 г у флаконах.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.