

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГРУДНИЙ ЗБІР № 1

Склад лікарського засобу.

Діючі речовини: 100 г збору містять листя мати-й-мачухи подрібненого 40 г, кореню алтею подрібненого 40 г та трави материнки подрібненої 20 г.

Лікарська форма. Збір.

Назва і місцезнаходження виробника. ЗАТ “Фармацевтична фабрика “Віола”,
Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група. Відхаркувальний засіб. Код АТС R05C A10.

Фармакологічні властивості. Листя мати-й-мачухи, яке входить до складу препарату, містить глікозиди, сапоніни, каротиноїди, галову, яблучну й винну кислоти, ситостерин, аскорбінову кислоту, інулін, декстрини, слиз, дубильні речовини, сліди ефірної олії, мають відхаркувальний ефект, відновлюють активність в'їчастого епітелію трахеї та бронхів, виявляють протизапальну дію. Трава материнки має відхаркувальну дію завдяки вмісту в ній ефірної олії, фенолів, тимолу, гераніацетату, карвакролу та інших летких й ароматичних сполук, жирної олії, аскорбінової кислоти та дубильних речовин. Корінь алтею містить слиз, крохмаль, цукор, аспарагін, пектини, завдяки чому виявляє протизапальну, пом'якшувальну, відхаркувальну та захисну обволікаючу дію на слизову оболонку шлунка.

Показання для застосування. Як відхаркувальний засіб призначають при запальних захворюваннях дихальних шляхів.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Не встановлені.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Не рекомендується призначати жінкам у періоди вагітності та годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не встановлена.

Діти. Не рекомендується призначати дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози. Для приготування настою столову ложку збору кладуть в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) холодної кип'яченої води, закривають кришкою, нагрівають у киплячій воді на водяній бані 15 хв, настоюють при кімнатній температурі 45 хв, проціджують. Сировину, що залишилася, віджимають у проціджений настій. Об'єм останнього доводять кип'яченою водою до 200 мл. Приймають внутрішньо по 1/2 склянки (100 мл), 3 - 4 рази на добу, після їди.

2 фільтр-пакети кладуть у скляний або емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) окропу, закривають і настоюють 15 хв. Приймають внутрішньо по 1/2 склянки (100 мл), 3 - 4 рази на добу після їди.

Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання, терапевтичного ефекту та індивідуальної чутливості до препарату.

Передозування. Не спостерігалось.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції на компоненти препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не встановлена.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при кімнатній температурі (15–25°C); приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 50 г у пакетах, пачках; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачках.

Категорія відпуску. Без рецепта.