

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
ДУБА КОРА
(CORTEX QUERCUS)

Загальна характеристика:

міжнародна назва: Quercus;

основні фізико-хімічні властивості: кора світло-бурого, світло-сірого, сріблястого або жовтувато-бурого кольору, зі слабким своєрідним запахом, сильно в'яжучим смаком;

склад: дуба кора.

Форма випуску. Кора.

Фармакотерапевтична група. Засоби для місцевого застосування в стоматології.

Код АТС А01А D11.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Препарати з кори дуба, що містить дубильні речовини, флавоноїди, галову й елагову кислоти, флорафен, пентозани, пектини, цукри, слиз та ін., мають в'яжучі, протизапальні та протигнільні властивості.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Показання для застосування. Стomatити, гінгівіти, пародонтити, запальні процеси зіву, фарингіти, ларингіти.

Спосіб застосування та дози. Препарат призначають дорослим та дітям старше 12 років.

2 столові ложки кори кладуть в емальований посуд, заливають 200 мл гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і нагрівають у киплячій воді (на водяній бані) 30 хвилин. Відвар одразу проціджують, сировину, що залишилася, віджимають. Об'єм одержаного відвару доводять кип'яченою водою до початкового об'єму 200 мл. Полоскання здійснюють 6-8 разів на день. Відвар перед застосуванням збовтують.

2 фільтр-пакети поміщають в скляний або емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) окропу, закривають і настоюють 15 хвилин. Полоскання здійснюють 6-8 разів на день.

Тривалість курсу лікування залежить від перебігу захворювання, його вираженості, характеру комплексної терапії.

Побічна дія. Не виявлена.

Протипоказання. Підвищена чутливість до біологічно активних речовин, що входять до складу препарату.

Передозування. Не виявлене.

Особливості застосування. Безпека та клінічна ефективність застосування дуба кори у дітей віком до 12 років не встановлені, том не рекомендується застосовувати препарат дітям цієї вікової групи.

Вагітність і годування груддю. Безпека та ефективність препарату при вагітності та в період годування груддю не вивчалися тому призначати його слід з урахуванням співвідношення користь для матері / ризик для плода (дитини).

Вплив на здатність керувати транспортними засобами або працювати зі складними механізмами. Не описаний.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не відома.

Умови та термін зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці, при температурі 15-25 °С; приготовлений відвар (настій) – у прохолодному місці не більше 2 діб. *Термін придатності* - 5 років.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 50 г у пакетах, пачках; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачках.

Виробник. ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола".

Адреса. Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.