

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
ПРИЧЕПИ ТРАВА
(HERBA BIDENTIS)

Склад лікарського засобу: *Bidens tripartita*;

основні фізико-хімічні властивості: шматочки листя, стебел, бутонів і квіток; колір зелений, бурувато-зелений чи зеленувато-фіолетовий із грязнувато-жовтими вкраплен-нями, запах слабкий, ледь відчутний, смак гіркуватий, злегка в'язкий;

склад: причепа трава.

Форма випуску. Трава.

Фармакотерапевтична група. Дерматологічні препарати. Код АТС D11A X20.

Фармакологічні властивості. Комплекс хімічних сполук причепа трави (дубильні речовини і гіркоти, аскорбінова кислота, каротин, кумарини, флавоноїди, пігменти, мікроелементи, аміни, сліди ефірної олії) нормалізує порушення обміну речовин, має сечогінні та потогінні властивості, протизапальний і протиалергічний впливи, певний бактерицидний ефект, покращує травлення.

Показання для застосування. У педіатричній практиці застосовують місцево при діатезах. Крім того, при піодермії, псоріазі, екземах. Іноді – як сечогінний засіб, а також (при застудних захворюваннях) як потогінний засіб.

Спосіб застосування та дози. 3 столові (10 г) ложки трави кладуть в емальований посуд, заливають 200 мл гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і нагрівають на водяній бані протягом 15 хв, охолоджують при кімнатній температурі 45 хв, проціджують, залишки сировини віджимають. Об'єм одержаного настою доводять кип'яченою водою до 200 мл.

2 фільтр-пакети (3 г) вміщують у скляний або емальований посуд, заливають 100 мл (1/2 склянки) окропу, закривають і настоюють 15 хв.

Застосовують зовнішньо для ванн (із розрахунку 1 склянка настою на 10 л води) або у вигляді примочок (просочену настоєм марлеву серветку накладають на уражену ділянку шкіри). Частота процедур залежить від характеру уражень.

Застосовують внутрішньо. Дорослі та діти старше 12 років приймають по 1/3-1/2 склянки 2-3 рази на день після їди.

Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання та індивідуальної чутливості до препарату.

Побічна дія. Можливі алергічні реакції при підвищеній чутливості (кропив'янка, свербіж).

Противпоказання. Підвищена чутливість до біологічно активних речовин, що входять до складу препарату. Дитячий вік до 12 років при застосуванні внутрішньо.

Передозування. При підвищеній чутливості можливий розвиток алергічних реакцій (почервоніння та висипи на шкірі, свербіж).

Особливості застосування.

Вагітність і годування груддю. Безпека та клінічна ефективність препарату під час вагітності та в період годування груддю не вивчалась, тому призначати його внутрішньо слід з урахуванням співвідношення користь для матері/ризик для плода (дитини).

Вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати зі складними механізмами. Не описаний.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Невідома.

Умови та термін зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при кімнатній температурі (15-25 °С); приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.

Термін придатності. 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 50 г у пакетах, пачках; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачці.

Виробник. ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Адреса. Україна. 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.