

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
ХВОЩА ПОЛЬОВОГО ТРАВА
(HERBA EGUISETI ARVENSIS)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: висушена, подрібнена трава сіро-зеленого кольору зі слабким запахом, терпка на смак;

склад: хвоща польового трава.

Форма випуску. Трава.

Фармакотерапевтична група. Рослинні препарати з діуретичним ефектом.

Код АТС С03В Х10.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Препарати із хвоща польового трави належать до діуретичних засобів. Виявляють сечогінну, кровоспинну та протизапальну дію.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Показання для застосування. Як сечогінний засіб при захворюваннях серця та інших станів, що супроводжуються застійними явищами, зокрема набряках при хронічній серцевій недостатності. Призначають також при циститах, уретритах, гемороїдальних і маткових кровотечах.

Спосіб застосування та дози. 10 г (2 столові ложки) трави заливають склянкою холодної води і кип'ятять протягом 30 хв на слабкому вогні, охолоджують і проціджують. Дорослі приймають по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу. Діти, з 12 років, – по 1 чайній ложці 3 рази на добу. Перед застосуванням відвар рекомендується збовтувати.

2 фільтр-пакети кладуть у скляний або емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) окропу, закривають і настоюють 15 хв. Дорослі застосовують внутрішньо в теплом вигляді, по ½ -1 склянці 3-4 рази на добу, через 1 год після прийому їжі. Діти, з 12 років, – по ¼-1/3 склянки, 3 рази на добу, через 1 год після прийому їжі.

Побічна дія. Препарати із трави хвоща польового можуть спричинити подразнення нирок. Алергічні реакції.

Протипоказання. Безпека та ефективність застосування Хвоща польового трави для дітей не встановлені, тому не рекомендується без призначення лікаря застосовувати препарат для дітей віком до 12 років.

Нефрити, нефрози, нефрозо-нефрити.

Передозування. Препарат, як правило, переноситься добре, проте у деяких хворих при індивідуальній підвищеній чутливості можливий розвиток алергічних реакцій (почервоніння та висипи на шкірі, свербіж).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не встановлена.

Умови та термін зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при кімнатній температурі (15-25 °С); приготовлений відвар (настій) – у прохолодному місці не більше 2 діб.

Термін придатності – 4 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 50 г у пакетах, пачках; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачках.

Виробник. ЗАТ фармацевтична фабрика “Віола”.

Адреса. Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.