

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату**ГЛІЦЕРИН****Склад лікарського засобу:**

діюча речовина: гліцерин;
10 г розчину містять гліцерину 8,5 г;
допоміжні речовини: вода очищена.

Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування.

Сиропоподібна, безбарвна, в'язка, солодка на смак, без запаху, гігроскопічна рідина

Назва і місцезнаходження виробника.

Державне підприємство «Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України».

Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15а.

Фармакотерапевтична група.

Засоби з пом'якшувальною та захисною дією.

Код АТС D02A X.

Гліцерин чинить пом'якшувальну дію на шкіру. Гліцерин також застосовується як розчинник для борної кислоти, бури, протарголу, таніну.

Гліцерин майже не проникає крізь шкіру, але добре проникає крізь слизові оболонки.

Показання для застосування.

Для пом'якшення шкіри та обробки слизових оболонок. Як основа для виготовлення лініментів та мазей.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість. Наявність пошкодженої шкіри (тріщини, відкриті рани).

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу.

Спосіб застосування та дози.

Зовнішньо обробляють шкіру та слизові оболонки, роблять аплікації 30 % розчином на суху шкіру (препарат розводять водою у 3 рази).

Передозування.

Не виявлено.

Побічні ефекти.

Не виявлені.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

5 років.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 15 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 30 г у флаконах

Категорія відпуску.

Без рецепта.