

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

МАЗЬ ДР. ТАЙССА З ЖИВОКОСТОМ

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 10 г мазі містять настойки живокосту (1:5) 1 г, токоферолу ацетат (вітамін Е) 0,1 г;

допоміжні речовини: олія кукурудзяна, свинячий жир, ароматизатор соснової хвої, барвник –мідний комплекс хлорофілів (Е 141), антиоксидант Кові-окс Т-90.

Лікарська форма. Мазь.

Мазь світло-зеленого кольору з характерним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ.

Міхелінштрассе 10

66424 Хомбург

Німеччина.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що застосовуються місцево при болях у суглобах і м'язах. Код АТС М02А Х10.

Дія препарату визначається компонентами, що входять до його складу. Основними діючими речовинами кореня живокосту є алантоїн, слизисті і дубильні речовини. Вони зумовлюють протизапальний, безболісний ефект, сприяють формуванню кісткової мозолі. Алантоїн регенерує епітелій, зменшує болісність.

Вітамін Е посилює ефект алантоїну, поліпшує живлення клітин, захищає їх від руйнування.

Показання для застосування.

Біль у суглобах, спині, попереку при радикулітах, остеохондрозі, артритах. Спортивні, побутові травми-забиття, розтягнення сухожиль, закриті переломи кісток. Сухість, тріщини шкіри.

Протипоказання.

Препарат протипоказаний дітям віком до 12 років, жінкам у період вагітності або годування груддю. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат протипоказаний жінкам у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Невідома.

Діти.

Препарат протипоказаний дітям віком до 12 років

Спосіб застосування та дози.

Дорослим і дітям віком старше 12 років 2-3 рази на добу наносити мазь товстим шаром на ушкоджені ділянки. На ніч нанести товстий шар мазі і зробити пов'язку.

Тривалість лікування залежить від характеру та перебігу захворювання, але в цілому не має перевищувати 4-6 тижнів протягом року.

Передозування.

Про випадки передозування не повідомлялося.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції на складові препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. Скляні банки по 20 г, 50 г, 100 г у картонній упаковці.

Категорія відпуску. Без рецепта.