

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату

ЧЕБРЕЦЮ ТРАВА

Склад лікарського засобу. Чебрецю трава.

Лікарська форма. Трава.

Назва і місцезнаходження виробника. ЗАТ “Ліктрави”.

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Відхаркувальні препарати.

Код АТС R05C A18**.

Показання для застосування. Захворювання дихальних шляхів (ларингіти, трахеїти, бронхіти, бронхопневмонії); шлунково-кишкові захворювання, що супроводжуються секреторною недостатністю шлунка, атонією або спазмами кишечника, метеоризмом.

Протипоказання. Вагітність та період годування груддю, тяжкі захворювання печінки та нирок, гіперчутливість до препарату, дитячий вік до 3 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Перед початком лікування порадьтеся з лікарем.

Спосіб застосування та дози. 1 столову ложку трави вміщують в емальований посуд, заливають 200 мл гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і настоюють на киплячій водяній бані 15 хв. Охолоджують при кімнатній температурі 45 хв, проціджують, залишок віджимають до процідженого настою. Об'єм настою доводять кип'яченою водою до 200 мл. Дорослі приймають у теплому вигляді по 1/3 склянки 3 - 4 рази на день за 15 - 20 хв до їди. Діти 3 - 5 років - по 1 десертній ложці, 5 - 7 років - по 1 столовій ложці, 7 - 12 років - по 2 столові ложки, 12 - 14 років - по 1/4 склянки, старше 14 років - по 1/3 склянки 3 рази на день за 15 - 20 хв до їди. Перед вживанням настій рекомендується збовтувати.

3 фільтр-пакети вміщують у скляний або емальований посуд, заливають 200 мл окропу, закривають і настоюють 15 хв. Дорослі приймають у теплому вигляді по 1/3 склянки 3 - 4 рази на день за 15 - 20 хв до їди. Діти 3 - 5 років - по 1 десертній ложці, 5 - 7 років - по 1 столовій ложці, 7 - 12 років - по 2 столові ложки, 12 - 14 років - по 1/4 склянки, старше 14 років - по 1/3 склянки 3 рази на день за 15 - 20 хв до їди.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. При передозуванні можливі нудота, дискомфорт, головний біль. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції (гіперемія, висипи, свербіж та набрякання шкіри). При появі побічних реакцій припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з лікарськими засобами. Невідома.

Термін придатності. 2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Умови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці. Приготований настій – у прохолодному (8 - 15 °С) місці не більше 2 діб.

Упаковка. По 40 г або по 50 г у пачках із внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20.

Категорія відпуску. Без рецепта.