

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

КАРБОДЕРМ-ДАРНИЦЯ®
(CARBODERM-DARNITSA)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 г крему містить 50 мг або 100 мг сечовини (в перерахуванні на 100 % сухої речовини);

допоміжні речовини: цетилпіридинію хлорид, пропіленгліколь, олія мінеральна, спирт цетостеариловий, вода очищена.

Лікарська форма. Крем.

Крем білого кольору без запаху.

Назва і місцезнаходження виробника. ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.

Фармакотерапевтична група. Препарати з пом'якшувальною та захисною дією. Сечовина. Код АТС D02A E01.

Крем Карбодерм-Дарниця чинить гідратуючу, кератолітичну, протисвербіжну, антибактеріальну та протигрибкову дію. Внаслідок застосування крему зменшуються прояви гіперкератозу, пом'якшується та зволожується шкіра, підвищується її еластичність, покращується епітелізація поверхневих пошкоджень. Сечовина препарату в концентрації 10 % діє бактерицидно та фунгіцидно завдяки цетилпіридинію хлориду, що входить до складу препарату. У концентрації 5 % сечовина препарату діє бактериостатично та фунгістатично. За рахунок слабкої місцевоанестезуючої дії сечовини препарат чинить протисвербіжну дію.

Високомолекулярні полімерні речовини мажевої основи утримують сечовину на поверхні місця нанесення, запобігають її трансдермальному всмоктуванню, завдяки цьому сечовина не потрапляє в системний кровотік.

Показання для застосування.

Лікування захворювань шкіри, що супроводжуються підвищеним утворенням зроговілого епітелію.

Крем Карбодерм-Дарниця 5 % застосовують для лікування хронічної ліхеніфікованої екземи, нейродерміту, атопічного дерматиту, псоріазу (за винятком ексудативних форм).

Крем Карбодерм-Дарниця 10 % застосовують для лікування псоріазу (у стаціонарній стадії при значній інфільтрації), себореї, кератомікозів, гіперкератозів, гіперкератичних форм екземи, іхтіозу.

Протипоказання.

Застосування крему Карбодерм-Дарниця протипоказане при індивідуальній підвищеній чутливості до сечовини або інших компонентів крему, а також при дерматозах, що супроводжуються вираженою ексудацією.

Особливі застереження.

Для запобігання впливу на здорові тканини бажано, щоб ділянка шкіри, на яку наносять крем, не перевищувала розмір ураженої зони.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Препарат застосовують у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Діти.

Препарат не призначають дітям через відсутність клінічного досвіду.

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовують для лікування дорослих.

Концентрацію препарату (5 % або 10 %), а також дозу крему лікар призначає індивідуально залежно від типу захворювання, ступеня ураження та розміру ураженої ділянки. Крем (у середньому 1-4 см) наносять тонким шаром на уражену ділянку шкіри 2 рази на добу. Для підвищення ефективності лікування можна застосовувати оклюзійні пов'язки; крем із концентрацією сечовини 5 % можна використовувати при проведенні фонофорезу.

Тривалість лікування, яка може становити у середньому 1-2 тижні, визначає лікар залежно від виду і тяжкості захворювання, враховуючи регресію симптомів інфільтрації та ліхеніфікації шкіри.

Передозування.

Випадків передозування препаратом Карбодерм-Дарниця не виявлено.

Побічні ефекти.

У поодиноких випадках можливий розвиток дерматологічних реакцій: почервоніння шкіри, свербіж, поколювання та подразнення шкіри.

Зрідка можлива поява відчуття печіння, яке частіше виникає при використанні оклюзійної пов'язки.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодії крему Карбодерм-Дарниця з іншими препаратами не виявлено, однак слід зважати, що одночасне застосування крему з іншими мазями або кремами може призвести до посилення всмоктування лікарських речовин, які входять до їх складу.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі від 15 °С до 25 °С.

Упаковка.

По 30 г у тубах, по 1 тубі в пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.