

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ВЕНОРУТИНОЛ
(VENORUTINOL)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 г гелю містить 20 мг венорутинолу;

допоміжні речовини: етанол (96 %), гліцерин, динатрію едетат (трилон Б), карбопол, натрію

гідроксид 30 % розчин, вода очищена.

Лікарська форма. Гель.

Гель жовтого кольору, однорідної консистенції, зі слабким специфічним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».

Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, 17.

Фармакотерапевтична група. Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби.

Біофлавоноїди. Троксерутин. Код АТС C05C A04.

Фармакологічні властивості.

Венорутинол (синтетичний аналог троксерутину) - препарат з Р-вітамінною активністю та

вираженими ангіопротекторними властивостями.

Зменшує проникність та ламкість капілярів за рахунок стабілізації гіалуронової кислоти, підвищує тонус гладких м'язів венозних кровоносних судин.

Виявляє протинабрякову, протизапальну та знеболювальну дію.

Показання для застосування.

Профілактика та лікування варикозного розширення вен;
біль та набряки кінцівок, обумовлені венозною недостатністю;
трофічні порушення та виразки при хронічній венозній недостатності;
тромбози, тромбофлебіти;
післяфлебітні стани;
закриті травми (у тому числі спортивні).

Протипоказання.

Венорутинол протипоказаний при підвищеній чутливості до компонентів препарату. Вік до 14 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Немає.

Особливі застереження.

Перед початком лікування слід порадитися з лікарем.

Не наносити на ушкоджені ділянки шкіри та стежити, щоб препарат не потрапив в очі та на

слизові оболонки. Можна наносити під оклюзійну пов'язку.

Якщо ознаки захворювання не почнуть зникати або, навпаки, стан здоров'я

погіршитися, або почнуться небажані явища, необхідно призупинити прийом препарату та звернутися по консультацію до лікаря щодо подальшого застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосування препарату в період вагітності виправдане лише в тому випадку, коли передбачувана користь для матері, на думку лікаря, перевищує потенційний ризик для плода. У випадку застосування препарату жінками, які годують груддю, вигодовування слід припинити.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Застосування препарату не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Діти.

Клінічні дані щодо ефективності та безпеки застосування препарату у дітей відсутні, тому не слід застосовувати Венорутинол у пацієнтів віком до 14 років.

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовується зовнішньо. Гель тонким шаром наносять вранці та ввечері на уражені ділянки за допомогою легких масажних рухів до його повного всмоктування в шкіру. Курс лікування залежить від тяжкості захворювання та може тривати до 20 днів.

Передозування.

Випадки передозування Венорутинолу невідомі.

Побічні ефекти. В окремих випадках спостерігаються місцеві реакції гіперчутливості - кропив'янка, дерматит, екзема. Більшість із зазначених проявів швидко зникає після відміни препарату.

У випадку виникнення будь-яких негативних реакцій обов'язково порадьтеся з лікарем щодо подальшого застосування препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Інформація щодо будь-якої взаємодії Венорутинолу з іншими лікарськими засобами не надходила.

Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, обов'язково повідомте про це лікаря.

Термін придатності.

2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі від 15°C до 25°C.

Упаковка.

По 40 г у тубі та пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

