

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ДЕРЕВІЮ ТРАВА

Склад лікарського засобу. Деревію трава.

Лікарська форма. Трава.

Шматочки кошиків, окремих квіток, листків, стебел різноманітної форм. Колір сірувато-зелений з білувато-жовтуватими вкрапленнями. Запах слабкий, ароматний. Смак пряний, гіркуватий.

Назва і місцезнаходження виробника. ЗАТ Фармацевтична фабрика “Віола”.

Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група. Гемостатичні засоби рослинного походження.

Код АТС В02В Х04.

Фармакологічні властивості. Препарати із трави деревію, що містить комплекс біологічно активних речовин (алкалоїд ахілеїн, ефірну олію, глікозиди – апігенін і лютеолін, дубильні речовини, смоли, амінокислоти, органічні кислоти, каротин, вітамін К, аскорбінову кислоту, гіркі речовини) посилюють згортання крові, чинять протизапальну, бактерицидну, антиалергічну дію, виявляють спазмолітичний ефект щодо гладких м'язів кишечника, сечовивідних і жовчних шляхів.

Показання для застосування. Деревію траву застосовують як кровоспинний засіб та засіб, який покращує функцію шлунково-кишкового тракту. Як кровоспинний засіб призначають при маткових кровотечах внаслідок розвитку фіброміом, запальних процесів.

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість, вагітність, підвищене згортання крові, схильність до тромбоутворення.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Препарат протипоказаний при вагітності. За необхідністю застосування препарату в період годування груддю лікар повинен визначити співвідношення користь/ризик.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не встановлена.

Діти. Безпека та ефективність застосування деревію трави у дітей не встановлені, тому дітям віком до 12 років препарат не застосовують.

Спосіб застосування та дози. 2 столові ложки деревію трави кладуть в емальований посуд, заливають склянкою (200 мл) окропу, закривають кришкою і витримують у киплячій воді (на водяній бані) 15 хв. Охолоджують до кімнатної температури, проціджують. Залишок віджимають і доводять кип'яченою водою до початкового об'єму 200 мл. Дорослі та діти старше 12 років приймають внутрішньо у теплом вигляді по 1/4 склянки 2 - 4 рази на добу за 15 - 20 хв до їди з невеликою кількістю води.

2 фільтр-пакети поміщають у скляний або емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) окропу, закривають і настоюють 15 хв. Дорослі та діти старше 12 років приймають внутрішньо у теплом вигляді по 1/4 склянки 2 - 4 рази на добу за 15-20 хв до їди з невеликою кількістю води.

Тривалість лікування залежить від форми, тяжкості захворювання, ефективності препарату, а також від характеру комплексної терапії.

Передозування. Не виявлене.

Побічні ефекти. Не встановлені.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не відома.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці при кімнатній (15 - 25 °С) температурі, приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2-х діб.

Упаковка. По 50 г у пакетах, пачках; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачках.

Категорія відпуску. Без рецепта.