

**Побічні ефекти.**

Частота виникнення побічних реакцій, наведених нижче, оцінюється наступним чином:  
дуже часто ( $\geq 1/10$ ); часто ( $\geq 1/100, < 1/10$ ); нечасто ( $\geq 1/1000, < 1/100$ ); рідко ( $\geq 1/10000, < 1/1000$ );  
дуже рідко ( $< 1/10000$ ), невідомо (неможливо визначити частоту на підставі існуючих даних).

Побічні реакції при короткотривалому застосуванні проявляються наступним чином:

*З боку шлунково-кишкового тракту:*

часто – метеоризм, абдомінальний біль або дискомфорт, діарея.

*З боку імунної системи:*

дуже рідко – алергічні реакції, у тому числі набряк Квінке та шкірні реакції.

Тривале застосування часто супроводжуються збільшенням виведення води, калію та інших солей з організму. Це, в свою чергу, може спричинити посилення атонії кишечника; призвести до порушень серцевої діяльності і м'язової слабкості, особливо при одночасному прийомі сечогінних засобів і кортикостероїдів.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** При тривалому застосуванні/застосуванні великих доз препарату через дефіцит калію можливе посилення дії серцевих глікозидів. Втрата калію може посилитися при комбінаціях з діуретиками і кортикостероїдами.

Оскільки натрію пікосульфат метаболізується в свою активну форму під впливом бактерій у товстому кишечнику, одночасний прийом з антибіотиками може призвести до зменшення або відсутності проносної дії препарату РЕГУЛАКС Пікосульфат краплі.

**Термін придатності.** 5 років.

Термін придатності після відкриття флакону – 6 місяців.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 20 мл у флаконі-крапельниці разом з інструкцією для медичного застосування у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.