

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЕРИНІТ
(ERYNIT)

Склад:

діюча речовина: 1 таблетка містить пентаеритритилу тетраїтрату 10 мг;

допоміжні речовини: крохмаль картопляний, глюкоза, кислота стеаринова, сахароза, тальк.

Лікарська форма. Таблетки.

Фармакотерапевтична група. Серцево-судинні засоби, вазодилататори.

Код АТС C01D A05.

Клінічні характеристики.

Показання. Профілактика нападів стенокардії.

Протипоказання. Підвищена чутливість до препарату та до інших органічних нітратів, виражена артеріальна гіпотензія, колапс, шок, гострий інфаркт міокарду з ортостатичною гіпотензією, геморагічний інсульт. Черепно-мозкова травма, порушення мозкового кровообігу, закритокутова глаукома, вагітність, період годування груддю, дитячий вік до 18 років (ефективність та безпека не встановлені).

Спосіб застосування та дози. Дорослі приймають препарат внутрішньо по 10-20 мг за 1 годину до прийому їжі (1-2 таблетки) 3-4 рази на добу, при необхідності – до 40 мг 4 рази на добу, допускається призначення до 80 мг 2 рази на добу.

Для попередження нічних нападів стенокардії призначають по 20 мг препарату перед сном. Курс лікування зазвичай триває 2-4 тижні. Повторні курси лікування – за призначенням лікаря.

Побічні реакції. Алергічні реакції, шкірні висипання, свербіж, головний біль, шум у вухах, запаморочення, нудота, слабкість, тахікардія, підвищена втомлюваність, тривожність, підвищене потовиділення, зниження артеріального тиску, ортостатична гіпотензія, іноді спостерігається діарея.

Передозування. Посилення побічних ефектів. Лікування – промивання шлунку, застосування активованого вугілля, симптоматична терапія.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.

Діти. Застосування препарату протипоказано.

Особливості застосування. У зв'язку з повільним розвитком ефекту від застосування препарату, не застосовують для купірування нападів стенокардії. Необхідно виключити в процесі лікування вживання алкоголю.

Препарат містить сахарозу, що треба враховувати хворим на цукровий діабет.

При тривалому застосуванні можливе зниження терапевтичного ефекту (розвиток толерантності). При застосуванні препарату 1 раз на добу у поєднанні з іншими атиангінальними засобами ризик розвитку толерантності зменшується.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими

