

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату

РЕНЕЛЬ Н
(RENEEL N)

Склад лікарського засобу:

Діючі речовини: 1 таблетка містить: Berberis vulgaris D2 – 15 мг, Acidum nitricum D4 – 30 мг, Lytta vesicatoria D5 – 30 мг, Causticum Hahnemanni D4 – 50 мг, Plumbum aceticum D6 – 30 мг, Aluminium oxydatum D12 – 75 мг, Serenoa repens D2 – 30 мг;
Допоміжні речовини: магнію стеарат, лактоза моногідрат.

Лікарська форма. Таблетки.

Зруглі, плоскі з фаскою, від білого до жовто-білого кольору, можливі поодинокі жовті крапління, без запаху.

Назва і місцезнаходження виробника.

Зіологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.
Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат чинить протизапальну, спазмолітичну, знеболювальну, діуретичну дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації його функцій.

Показання для застосування.

Гострі та хронічні запальні захворювання нирок і сечовивідних шляхів (нефрит, пієлонефрит), сечокам'яна хвороба.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Особливі застереження.

Препарат містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не можна застосовувати препарат.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Зипадки негативного впливу невідомі.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Невідома.

Діти.

Препарат застосовують для лікування дітей старше 6 років.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дорослим та дітям віком від 6 років – 1 таблетка під язик (до повного розсмоктування), приймати 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди або через годину після їди.

У разі гострого початку захворювання приймати разову дозу кожні 15 хвилин протягом перших 2 годин.

Курс лікування – 2-4 тижні.

Лікар може зменшувати частоту прийому до 1-2 разів на добу та при необхідності повторювати курс лікування через 2-3 тижні.

Передозування.

Не відзначалось.

Побічні ефекти.

У осіб з індивідуальною чутливістю до компонентів препарату можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

У гомеопатичній літературі описано, що застосування Coffea arabica може знижувати терапевтичну ефективність компонента Lytta vesicatoria.

Термін придатності. 5 років.**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Закривати контейнер з таблетками негайно після застосування, захищати від вологи та нагрівання.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Поліпропіленовий контейнер на 50 таблеток у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.