

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**СЕНИ ЛИСТЯ**

**Склад лікарського засобу:** сени листя.

**Лікарська форма.** Листя.

**Назва і місцезнаходження виробника.** ЗАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

**Фармакотерапевтична група.** Проносні засоби. Код АТС А06А В06.

**Показання для застосування.** Атонія товстого кишечника, хронічні запори.

**Протипоказання.** Гіперчутливість до препарату; геморой, тріщини прямої кишки, спастичний коліт, гепатит, панкреатит, нефрозонофрит; вагітність, період годування груддю; діти до 12 років.

**Особливі застереження.** Перед початком лікування порадьтеся з лікарем. Щоб уникнути звикання, препарати сени доцільно чергувати з іншими проносними засобами.

**Спосіб застосування та дози.** 2 столові ложки листя вміщують в емальований посуд, заливають 200 мл гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і настоюють на киплячій водяній бані 30 хв. Витримують при кімнатній температурі до повного охолодження, проціджують, залишок віджимають до отриманого відвару. Об'єм відвару доводять кип'яченою водою до 200 мл.

Дорослим приймати у теплому вигляді по 1/3-1/2 склянки на ніч або по 1 столовій ложці 1-3 рази на день. Дітям старше 12 років, за рекомендацією лікаря, залежно від віку – від 1 столової ложки до 1/4 склянки на ніч.

Перед вживанням відвар рекомендується збовтати.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

**Передозування.** При передозуванні можливі колікоподібний біль у животі, диспепсія, які потребують відміни препарату і призначення в'язучих засобів.

**Побічні ефекти.** Можливі колікоподібні болі у кишечнику, метеоризм. У таких випадках дозу зменшують. Тривале (до кількох років) застосування великих доз препаратів сени може спричинити атрофію гладкої мускулатури товстої кишки і порушення її інервації, відкладання у слизовій оболонці антроглікозидів і розвиток меланозу.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати у недоступному для дітей, сухому та захищеному від світла місці. Приготовлений відвар – у прохолодному (8-15 °С) місці не більше 2 діб.

**Упаковка.** По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**СЕНИ ЛИСТЯ**

**Склад лікарського засобу:** сени листя.

**Лікарська форма.** Листя.

**Назва і місцезнаходження виробника.** ЗАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

**Фармакотерапевтична група.** Проносні засоби. Код АТС А06А В06.

**Показання для застосування.** Атонія товстого кишечника, хронічні запори.

**Протипоказання.** Гіперчутливість до препарату; геморой, тріщини прямої кишки, спастичний коліт, гепатит, панкреатит, нефрозонофрит; вагітність та період годування груддю; діти до 12 років.

**Особливі застереження.** Перед початком лікування порадьтеся з лікарем. Щоб уникнути звикання, препарати сени доцільно чергувати з іншими проносними засобами.

**Спосіб застосування та дози.** 2 фільтр-пакети вміщують в скляний або емальований посуд, заливають 200 мл окропу, закривають і настоюють до повного охолодження.

Дорослим приймати внутрішньо по 1 склянці на ніч або по 1/4 склянки 1-3 рази на день. Дітям старше 12 років, за рекомендацією лікаря, залежно від віку – від 1/4 - 1/2 склянки на ніч.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

**Передозування.** При передозуванні можливі колікоподібний біль у животі, диспепсія, які потребують відміни препарату і призначення в'язучих засобів.

**Побічні ефекти.** Можливі колікоподібні болі у кишечнику, метеоризм. У таких випадках дозу зменшують. Тривале (до кількох років) вживання великих доз препаратів сени може спричинити атрофію гладкої мускулатури товстої кишки і порушення її інервації, відкладання у слизовій оболонці антроглікозидів і розвиток меланозу.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати у недоступному для дітей, сухому та захищеному від світла місці. Приготовлений відвар – у прохолодному (8-15 °С) місці не більше 2 діб.

**Упаковка.** По 2 г у фільтр-пакетах № 20.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.