

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

КУКУРУДЗИ СТОВПЧИКИ З ПРИЙМОЧКАМИ (ZEAE MAYDIS STYLI CUM STIGMATIS)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: нитковидні шматочки коричневого, коричнево-червоного, світло-жовтого кольору; запах слабкий, своєрідний.

склад: кукурудзи стовпчики з приймочками.

Форма випуску. Стовпчики з приймочками.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що застосовуються при біліарній патології.

Код АТС А05А Х10.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Препарат чинить жовчогінну, діуретичну, кровоспинну та гіпоглікемічну дію. При застосуванні внутрішньо спостерігається збільшення секреції жовчі, зменшення її в'язкості, зниження вмісту білірубину, збільшення вмісту протромбіну, прискорення згортання крові.

Фармакокінетика. Не вивчалася.

Показання для застосування. Холецистит, холангіт, гепатити з затримкою жовчовиділення, кровотечі, що пов'язані зі зниженням рівня протромбіну.

Спосіб застосування та дози. 10 г (3 столові ложки) стовпчиків з приймочками вміщують в емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і настоюють на киплячій водяній бані 30 хв. Охолоджують при кімнатній температурі, проціджують, залишок віджимають до процідженого відвару. Об'єм доводять кип'яченою водою до 200 мл. Приймають внутрішньо в теплому вигляді по ¼ склянки 3-4 рази на добу до їди.

2 фільтр-пакети кладуть у скляний або емальований посуд, заливають 200 мл (1 склянка) окропу, закривають і настоюють 15 хв. Приймають внутрішньо в теплому вигляді по ¼ склянки 3-4 рази на добу до їди.

Побічна дія. Можливі алергічні реакції.

Протипоказання. Прискорене згортання крові, обтураційна жовтяниця, тромбофлебіт, підвищена чутливість до компонентів препарату.

Передозування. Не виявлене.

Особливості застосування. Перед вживанням відвар (настій) рекомендується збовтувати.

Вагітність і годування груддю. Безпека та клінічна ефективність препарату при вагітності та в період годування груддю не вивчалися.

Безпека та ефективність застосування препарату у дітей не встановлена, тому не рекомендується без призначення лікаря застосовувати препарат для лікування дітей віком до 12 років.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не вивчалась.

Умови та термін зберігання. Зберігають у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при кімнатній (15-25 °С) температурі; приготовлений відвар (настій) – у прохолодному місці не більше 2 діб.

Термін придатності – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 30 г у пакетах, пачках; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачках.

Виробник. ЗАТ фармацевтична фабрика "Віола".

Адреса. Україна, м. Запоріжжя, 69063, вул. Кірова, 75.