

## ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

### КУКА

#### Склад лікарського засобу:

*діючі речовини:* 10 мл сиропу містять екстракти василька священного 50 мг, васачи 400 мг, кулінджани 400 мг, кореня солодки 400 мг, перцю довгого 200 мг, м'яти польової 2 мг;

*допоміжні речовини:* натрію бензоат (Е 211), метилпарабен (Е 218), пропілпарабен (Е 216), кислоти лимонної моногідрат, цукор, вода очищена.

#### Лікарська форма. Сироп.

Сироп темно-коричневого кольору зі специфічним запахом.

#### Назва і місцезнаходження виробника.

«Мултані Фармасьютикалз ЛТД».

Індія, С-100, Окхла Індастріал Ареа, Нью-Делі, 110 020, Індія.

#### Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються при кашлі і застудних захворюваннях. Код АТС R05X.

Комбінований препарат рослинного походження, який застосовується при різних застудних захворюваннях; швидко полегшує кашель, зменшує всі види кашлю, чинить бронхолітичну, муколітичну, відхаркувальну, протизапальну і заспокійливу дію.

Васильок священний має жарознижувальну, вітрогонну, потогінну, відхаркувальну, спазмолітичну і сечогінну дію. Васача містить алкалоїд, який при прийомі внутрішньо перетворюється на активний метаболіт амброксол, що зменшує в'язкість мокротиння, підсилює мукоциліарний транспорт і синтез сурфактанта. Чинить значну відхаркувальну дію, запобігає блюванню. Кулінджана має відхаркувальну, тонізуючу, сечогінну, протиглисну дію. Корінь солодки має жарознижувальну, протизапальну і спазмолітичну дію. Перець довгий має відхаркувальну, вітрогонну дію. М'ята польова чинить знеболювальну, потогінну і заспокійливу дії, застосовується при застуді.

#### Показання для застосування.

Симптоматичне лікування усіх видів продуктивного та непродуктивного кашлю, обумовленого гострими респіраторними інфекціями, астмою, ринітом, фарингітом, кашлем, ларингітом, бронхітом, тонзилітом; кашель курців.

#### Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Цукровий діабет, ниркова і печінкова недостатність, гіпокаліємія, артеріальна гіпертензія, тяжкий ступінь ожиріння. Вагітність і період годування груддю. Дитячий вік до 12 років.

#### Належні заходи безпеки при застосуванні.

У зв'язку з наявністю у складі препарату цукру з обережністю застосовувати хворим з підвищеним вмістом глюкози в крові.

Оскільки до складу препарату входить екстракт кореня солодки слід з особливою обережністю застосовувати сироп Кука при наявності холестатичних та запальних захворювань печінки, цирозі печінки, гіпокаліємії. Тривале застосування препаратів солодки може спричинити розвиток ефектів, притаманних мінералокортикоїдам, а саме, порушення електrolітного балансу (затримка натрію та втрата калію), що може супроводжуватися підвищенням артеріального тиску і призвести до утворення

набряків. В окремих випадках можливі гіпоглікемічна міопатія та міоглобінурія.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Не застосовують.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.* Не впливає.

*Діти.* Не застосовують дітям віком до 12 років.

**Спосіб застосування та дози.**

Дорослим і дітям старше 12 років призначають по 2 чайні ложки (10 мл) 3 рази на добу. Приймати через кожні 6 годин, але не більше 4 разів на добу.

Середня тривалість курсу лікування – 1 тиждень.

**Передозування.**

Можливе посилення побічних ефектів.

*Лікування:* симптоматична терапія.

**Побічні ефекти.**

При індивідуальній підвищеній чутливості можливий розвиток *алергічних реакцій* (висипання, свербіж, гіперемія шкіри, набряки).

Тривале застосування препаратів, що містять корінь солодки, у надмірних дозах може спричинити *порушення водно-електролітного балансу* і призвести до утворення *набряків*, розвитку *гіпокаліємії*; в окремих випадках можливі *підвищення артеріального тиску, гіпокаліємічна міопатія та міоглобінурія*.

У разі появи будь-яких небажаних явищ хворому необхідно звернутися до лікаря.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Слід уникати одночасного лікування іншими препаратами від кашлю, а також ліками, що зменшують утворення мокротиння. Застосування разом з антибіотиками та з іншими протимікробними засобами посилює ефект препарату.

Гіпокаліємія (через надмірне застосування кореня солодки) може посилюватися при взаємодії з серцевими глікозидами, антиаритмічними лікарськими засобами і препаратами, що впливають на серцевий ритм (наприклад, хінідин). При одночасному застосуванні з препаратами, що спричиняють гіпокаліємію (тіазидні та петльові діуретики, адренкортикостероїди та проносні лікарські засоби) може бути порушення електролітного обміну. Тому препарати, що містять корінь солодки, не слід застосовувати тривало одночасно з переліченими вище лікарськими засобами.

**Термін придатності.** 3 роки. Після розкриття флакона сироп зберігати протягом 14 днів.

**Умови зберігання.** Зберігати в сухому, темному місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 100 мл сиропу у флаконі, в картонній упаковці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.