

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ОСТЕОБІОС
(OSTEOBIOS)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 100 мл крапель містять: Os suis D10 – 5,5 мл, Os suis D30 – 5,5 мл, Os suis D200 – 5,5 мл, Glandula parathyroidea suis D10 – 6 мл, Glandula parathyroidea suis D30 – 6 мл, Glandula parathyroidea suis D200 – 6 мл, Calcium carbonicum D12 – 6 мл, Calcium carbonicum D30 – 6 мл, Calcium carbonicum D200 – 6 мл, Calcium phosphoricum D12 – 6 мл, Calcium phosphoricum D30 – 6 мл, Calcium phosphoricum D200 – 6 мл, Calcium fluoratum D12 – 6 мл, Calcium fluoratum D30 – 6 мл, Calcium fluoratum D200 – 6 мл, Master aminoacid pattern (MAP) D3 – 5,5 мл, Calcitonin D6 – 6 мл.

допоміжні речовини: етанол, вода очищена.

Препарат містить 30% об. етанолу.

1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма.

Краплі для перорального застосування.

Назва і місцезнаходження виробника.

Гуна С.п.а.

Вул. Палманова 71, 20132 Мілан, Італія.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат нормалізує в кістках мінеральний обмін (фосфору, магнію, кальцію), збалансовує функціональну активність остеокластів та остеобластів, припиняє вививання кальцію із кісток, поліпшує гістологічну структуру кісткової тканини, стимулює синтез білкових компонентів кісткової тканини.

Показання для застосування.

При комплексному лікуванні остеопорозу у дорослих і дітей віком від 12 років.

Протипоказання.

Відсутні.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого лікар може змінювати тривалість курсу лікування, дозу та частоту прийому.

Особливі застереження.**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Питання про доцільність застосування препарату вагітними та жінками, що годують груддю, лікар вирішує індивідуально з урахуванням співвідношення користь/ризик.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

В рекомендованих дозах не впливає.

Діти.

Не рекомендується застосовувати дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дорослим і дітям від 12 років – по 10-20 крапель. Приймати 3 рази на добу, за 30 хвилин до їди або через годину після. Краплі розчинити у 10-15 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті.

Курс лікування – 1-2 місяці.

Передозування.

У випадку передозування - терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Небажані впливи невідомі. У випадку появи будь-яких незвичних реакцій хворому слід порадитись з лікарем.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія поки що невідома.

Термін придатності.

5 років. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі-крапельниці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 15°C до 25°C у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 30 мл крапель у флаконі-крапельниці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.